

**“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE  
DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manejo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Usar guantes y gafas protectoras durante el manejo del concentrado.
- Evitar su inhalación, ingestión y contacto con la piel.
- Almacenar el producto en un lugar sombreado, bajo techo con llave y en el envase original.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Organoestánico
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión accidental, provocar el vómito. Efectuar el lavado gástrico cuidadoso.
- En caso de emergencia llamar gratis a CICOTOX 0800-1-3040. Essalud 117.

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y depositelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el tripe lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- No peligroso para abejas a las dosis recomendadas.
- No afecta a la fauna benéfica.
- Tóxico para peces, no contaminar lagos, ríos, estanque o arroyos con los desechos y envases vacíos.

# TOPEXATIN 600 F

**ACARICIDA AGRÍCOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC**

**Composición :**

Cihexatín.....600 g/L  
Aditivos ..... c.s.p 1L

**Reg. N° 487-97-AG-SENASA**

Titular del registro: HORTUS S.A.,  
Calle Sucre N°270, Ate. Lima, Perú

Formulado por:  
**anasac**  
EAST  
Zhejiang Longyou East Anasac  
Crop Science Co., Ltd.  
Town South Donghua District, Longyou  
County Zhejiang, China  
Tel: +86-(0)570-7855158

Importado y distribuido por:  
**hortus**  
Calle Sucre 270, Ate. Lima, Perú  
Telf.: 717-9040 / Fax: 718-8684  
RUC. 20101637221  
RU. N° 141097

Contenido neto :  
Lote N° :  
Fecha de formulación :  
Fecha de vencimiento :

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**TOPEXATIN 600 F** es un acaricida derivado del estaño, específico para el control de formas móviles de ácaros (ninfas y adultos) que actúa por contacto e ingestión, con un marcado poder residual de hasta 21 días. En cultivos de alta cobertura y frutales usar altos volúmenes de agua para las aplicaciones (1000 a 2000 l/Ha). No mezclar con aceites emulsionables, dejar pasar entre una aplicación de aceite y **TOPEXATIN 600 F** o viceversa como mínimo 15 días. No se recomienda aplicar en cítricos durante el período de floración hasta fruto joven. Se recomienda no adicionar adherente.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

**Cuadro de Usos**

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS ml/200L	P.C (Días)	LMR (ppm)
	N. COMUN	N. CIENTÍFICO			
Manzano	Araña roja	<i>Panonychus ulmi</i>	40 - 80	18	2
Limonero	Ácaro del Tostado	<i>Phyllocoptura oleivora</i>	45 - 90	18	2
Algodonero	Araña roja	<i>Tetranychus spp.</i>	50 - 80	18	2
Alfalfa	Ácaro de dos manchas	<i>Tetranychus urticae</i>	60 - 90	18	0.2
Frijol	Araña roja	<i>Tetranychus spp.</i>	50 - 80	18	0.5
Sandia	Araña roja	<i>Paratetranychus spp.</i>	50 - 100	18	0.5
Fresa	Araña roja	<i>Tetranychus urticae</i>	100 - 120	N.D.	0.01

LMR : Límite máximo de residuos en ppm

PC: Período de carencia en días

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN :** **TOPEXATIN 600 F** tiene un efecto residual de 10 a 12 días. Su uso se recomienda tan pronto se observe el ataque de arañas (2-5 arañas/hoja). Efectuar un mojamiento completo del árbol, cuidando que las hojas se queden cubiertas por ambos lados.

**PERIODO DE REINGRESO:** El reingreso al área tratada puede realizarse al día siguiente de la aplicación o hasta que seque la pulverización.

**COMPATIBILIDAD:** **TOPEXATIN 600 F** es compatible con la mayoría de insecticidas de uso agrícola, excepto con los de reacción alcalina y aceites agrícolas. En caso de combinaciones no experimentadas, efectuar previamente una prueba de compatibilidad física. No aplicar con cloruro de calcio, polisulfuros o caldo bordales. Dejar pasar 15 días entre una aplicación de aceite y la de **TOPEXATIN 600F**.

**FITOTOXICIDAD:** No presenta fitotoxicidad cuando se usa en las dosis recomendadas. Puede ser perjudicial cuando se aplica en sobredosis o en horas de calor intenso.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

