

LEA LA ETIQUETA (Y LA HOJA DE SEGURIDAD) ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar aspersión.

PRIMEROS AUXILIOS:

- **Grupo químico: Pyrazole**
- En caso de Intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca, y si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No se conoce antídoto específico. Tratamiento es sintomático.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

TÉLEFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC: 617-6400

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- "Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase."
- "Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado."



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- Peligroso para las abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para este fin.

CERTERO®

240SC

INSECTICIDA - ACARICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Chlorfenapyr..... 240 g/L
 Aditivos..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 295 - SENASA

Titular del Registro, Importado y distribuido por:
NEOAGRUM S.A.C.

neogrump

Calle Cantuarias 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima
 Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Contenido neto: 1 L

N° de Lote:

F. de Form.: "Ver parte superior"

F. de Venc.:

Formulado por:
 HANGZHOU CHANGHE AGRICULTURAL CHEMICAL CO., LTD
 64 Riverside Wharf Road, Changhe Town, Hangzhou,
 Zhejiang Province
 CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

CERTERO 240 SC actúa por contacto e ingestión y también tiene actividad translaminar. Es utilizado para el control de la polilla (*Tuta absoluta*) en el cultivo de tomate.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	mL/200L	L/ha		
Mandarina	Ácaro del tostado	<i>Phyllocoptruta oleivora</i>	50-60	0.15-0.18	7	0.05
Pimiento	Ácaro hialino	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	150	0.30	0	0.05
	Gusano perforador	<i>Heliothis virescens</i>	125	0.25	0	0.05
Tomate	Polilla	<i>Tuta absoluta</i>	125	0.25	3	0.05

P.C.: Período de Carenia L.M.R.: Límites máximos de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Iniciar el tratamiento químico a la aparición de la plaga en el cultivo.

Realizar máximo una aplicación por campaña, considerando 2 campañas al año.

PERIODO DE REINGRESO:

Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de las 24 horas después de la aplicación

COMPATIBILIDAD: CERTERO 240 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con los ácidos fuertes, productos alcalinos y agentes oxidantes.

FITOTOXICIDAD: CERTERO 240 SC no es fitotóxico para los cultivos recomendados si se sigue las recomendaciones dadas en la etiqueta

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LEA LA ETIQUETA (Y LA HOJA DE SEGURIDAD) ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar aspersión.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: **Pyreazolo**
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca, y si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No se conoce antídoto específico. Tratamiento es sintomático.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

TÉLFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC: 617-6400

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítalo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- "Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase."
- "Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado."

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:**

- Peligroso para las abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para este fin.

CERTERO®

240SC

INSECTICIDA - ACARICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Chlorfenapyr..... 240 g/L
Aditivos..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 295 - SENASA

Titular del Registro, Importado y distribuido por:
NEOAGRUM S.A.C.

neoagrum

Calle Cantuarias 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Contenido neto: 1 L

N° de Lote:

F. de Form.: "Ver parte superior"

F. de Venc.:

Formulado por:
SINOCHEM AGRO CO., LTD.
17-19 th Floor, N°33, He Nan Road(S) Shanghai, 200002
CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

CERTERO 240 SC actúa por contacto e ingestión y también tiene actividad translaminar. Es utilizado para el control de la polilla (*Tuta absoluta*) en el cultivo de tomate.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	mL/200L	L/ha		
Mandarina	Ácaro del tostado	<i>Phyllocoptruta oleivora</i>	50-60	0.15-0.18	7	0.05
Pimiento	Ácaro hialino	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	150	0.30	0	0.05
	Gusano perforador	<i>Heliothis virescens</i>	125	0.25	0	0.05
Tomate	Polilla	<i>Tuta absoluta</i>	125	0.25	3	0.05

P.C.: Período de Carenia L.M.R.: Límites máximos de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Iniciar el tratamiento químico a la aparición de la plaga en el cultivo.

Realizar máximo una aplicación por campaña, considerando 2 campañas al año.

PERIODO DE REINGRESO:

Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de las 24 horas después de la aplicación

COMPATIBILIDAD: CERTERO 240 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con los ácidos fuertes, productos alcalinos y agentes oxidantes.

FITOTOXICIDAD: CERTERO 240 SC no es fitotóxico para los cultivos recomendados si se sigue las recomendaciones dadas en la etiqueta

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LEA LA ETIQUETA (Y LA HOJA DE SEGURIDAD) ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar aspersión.

PRIMEROS AUXILIOS:

- **Grupo químico: Pyrazole**
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca, y si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No se conoce antídoto específico. Tratamiento es sintomático.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC: 617-6400

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítalo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- "Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase."
- "Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado."



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- Peligroso para las abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para este fin.

CERTERO®

240SC

INSECTICIDA - ACARICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Chlorfenapyr..... 240 g/L
 Aditivos..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 295 - SENASA

Titular del Registro, Importado y distribuido por:
NEOAGRUM S.A.C.

neogrump

Calle Cantuarias 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima
 Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Contenido neto: 1 L

N° de Lote:

F. de Form.: "Ver parte superior"

F. de Venc.:

Formulado por:
 SINOCHEN NINGBO, LTD.
 21 Jiangxia St. Ningbo 315000,
 CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

CERTERO 240 SC actúa por contacto e ingestión y también tiene actividad translaminar. Es utilizado para el control de la polilla (*Tuta absoluta*) en el cultivo de tomate.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	mL/200L	L/ha		
Mandarina	Ácaro del tostado	<i>Phyllocoptruta oleivora</i>	50-60	0.15-0.18	7	0.05
Pimiento	Ácaro hlalino	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	150	0.30	0	0.05
	Gusano perforador	<i>Heliothis virescens</i>	125	0.25	0	0.05
Tomate	Polilla	<i>Tuta absoluta</i>	125	0.25	3	0.05

P.C.: Período de Carenza L.M.R.: Límites máximos de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Iniciar el tratamiento químico a la aparición de la plaga en el cultivo.

Realizar máximo una aplicación por campaña, considerando 2 campañas al año.

PERIODO DE REINGRESO:

Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de las 24 horas después de la aplicación

COMPATIBILIDAD: CERTERO 240 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con los ácidos fuertes, productos alcalinos y agentes oxidantes.

FITOTOXICIDAD: CERTERO 240 SC no es fitotóxico para los cultivos recomendados si se sigue las recomendaciones dadas en la etiqueta

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



Envase PEAD

20.8 cm

0.8 cm

0.5 cm

7.7 cm

1.20 cm

LEA LA ETIQUETA (Y HOJA LA SEGURIDAD) ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
 - Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
 - Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
 - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
 - Peligroso si se inhala. Evite respirar aspersión.
- PRIMEROS AUXILIOS:**
- Grupo químico: Pirazolo
 - En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
 - En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua fresca, y si el contacto fuera con la piel, lávese con abundante agua y jabón.
 - No se conoce antidoto específico. Tratamiento es sintomático.

TÉLFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC: 617-6400

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DEBACHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para las abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estancias o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrante del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales los domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.



CERTERO®
240 SC

INSECTICIDA-ACARICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Clorfenapyr 240 g/L
Aditivos c.s.p 1 L

Reg. PQUA N° 295 - SENASA
Titular del Registro, Importado y distribuido por:
NEOAGRUM S.A.C.

neogrump
Calle Cantuarias 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Contenido neto: 250 ml

N° de Lote:
F. de Form.: "Ver parte superior"
F. de Venc.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

Formulado por:
SINOCHEN NINGBO LTD.
21 Jiangxia St Ningbo 315000,
CHINA

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

CERTERO 240 SC actúa por contacto e ingestión y también tiene actividad transaminar. Es utilizado para el control de la polilla (*Tuta absoluta*) en el cultivo de tomate.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C.	L.M.R.
	Nombre Común	Nombre Técnico	mL/200L	L/ha	(días)	(ppm)
Mandarina	Acaro del tostado	Phytoseius citi	50-60	0.15-0.18	7	0.05
Perianto	Acaro helado	Polysphogonemus letus	150	0.30	0	0.05
	Gusano perforador	Heliothis virescens	125	0.25	0	0.05
Tomate	Polilla	Tuta absoluta	125	0.25	3	0.05

P.C. Periodo de carencia L.M.R. Límites máximos de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Iniciar el tratamiento químico a la aparición de la plaga en el cultivo.

Realizar máximo una aplicación por campaña, considerando 2 campañas al año.

PERIODO DE REINGRESO: Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de las 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: CERTERO 240 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con los ácidos fuertes, productos alcalinos y agentes oxidantes.

FITOTOXICIDAD: CERTERO 240 SC no es fitotóxico para los cultivos recomendados si se sigue las recomendaciones dadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑO



VERSIÓN: 03-HZ
ÚLTIMA REVISIÓN: 31-10-12

0005

Envase PEAD

20.8 cm

0.8 cm

0.5 cm

7.7 cm

1.20 cm

LEA LA ETIQUETA (Y HOJA LA SEGURIDAD) ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
 - Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
 - Utilice ropa protectora durante el manejo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
 - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forajidos.
 - Peligroso si es inhalado. Evite respirar aspersión.
- PRIMEROS AUXILIOS:**
- Grupo químico: Pirazoles
 - En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.
 - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca, y si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
 - No se conoce antídoto específico. Tratamiento es sintomático.

TÉLEFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC: 017-6400

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y déjelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para las abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, esteros o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrante del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales los domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.



CERTERO®
240 SC

INSECTICIDA-ACARICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Clorfenapyr 240 g/L
Aditivos c.s.p 1 L

Reg. PQUA N° 295 - SENASA
Titular del Registro, Importado y distribuido por:
NEO AGRUM S.A.C.

neogradum
Calle Cantuarias 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima
Teléfono: 017-6400 / Fax: 017-6401

Contenido neto: 250 ml

N° de Lote:
F. de Form.: "Ver parte superior"
F. de Venc.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

Formulado por:
HANGZHOU CHANGRE AGRICULTURAL CHEMICAL CO., LTD
64 Riverside Road, Changsha, Hunan,
China

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

CERTERO 240 SC actúa por contacto e ingestión y también tiene actividad transaminar. Es utilizado para el control de la polilla (*Tuta absoluta*) en el cultivo de tomate.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C.	L.M.R.
	Nombre Común	Nombre Técnico	mL/200L	L/ha	(días)	(ppm)
Mandarina	Acaro del tostado	<i>Phytoseiulus abietis</i>	50-60	0.15-0.18	7	0.05
Pimiento	Acaro hialino	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	180	0.30	0	0.05
	Gusano perforador	<i>Heliothis virescens</i>	125	0.25	0	0.05
Tomate	Polilla	<i>Tuta absoluta</i>	125	0.25	3	0.05

P.C. Periodo de carencia

L.M.R. Límites máximos de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Iniciar el tratamiento químico a la aparición de la plaga en el cultivo.

Realizar máximo una aplicación por campaña, considerando 2 campañas al año.

PERIODO DE REINGRESO: Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de las 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: CERTERO 240 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con los ácidos fuertes, productos alcalinos y agentes oxidantes.

FITOTOXICIDAD: CERTERO 240 SC no es fitotóxico para los cultivos recomendados si se sigue las recomendaciones dadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



VERSIÓN: 03-HZ
ÚLTIMA REVISIÓN: 31-10-12

0000

Envase PEAD

20.8 cm

0.8 cm

0.5 cm

7.7 cm

1.20 cm

LEA LA ETIQUETA (Y HOJA LA SEGURIDAD) ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar aspersión.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Pirazolo.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca, y si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No se conoce antídoto específico. Tratamiento es sintomático.

TÉLFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC: 617-6400

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para las abejas u otros entomofitos beneficiosos. No aplicar en época de floración.
- Útil para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrante del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales los domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.



CERTERO®
240 SC

INSECTICIDA-ACARICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Clorfenapyr 240 g/L
Aditivos c.s.p 1 L

Reg. PQUA N° 285 - SENASA
Titular del Registro, Importado y distribuido por:
NEOAGRUM S.A.C.

neogrum
Calle Cantaritas 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Contenido neto: 250 ml

N° de Lote:
F. de Form.: "Ver parte superior"
F. de Venc.:

Formulado por:
SINOCHEAGROCO LTD V
17-19 B Floor, #311, Hu Ren Road(3) Shanghai, 201202
CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

CERTERO 240 SC actúa por contacto e ingestión y también tiene actividad transaminar. Es utilizado para el control de la polilla (*Tuta absoluta*) en el cultivo de tomate.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	mL/200L	L/ha		
Mandarina	Acaro del tostado	Phytocaputula oleivora	50-60	3 15-0 18	7	0 05
Pimiento	Acaro tielino	Polypogonatus nemus letus	180	0 30	0	0 05
	Gusano perforador	Heliothis virescens	125	0 25	0	0 05
Tomate	Polilla	Tuta absoluta	125	0 25	3	0 05

P.C. Período de curación L.M.R. Límites máximos de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Iniciar el tratamiento químico a la aparición de la plaga en el cultivo.

Realizar máximo una aplicación por campaña, considerando 2 campañas al año.

PERÍODO DE REINGRESO: Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de las 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: CERTERO 240 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con los ácidos fuertes, productos alcalinos y agentes oxidantes.

FITOTOXICIDAD: CERTERO 240 SC no es fitotóxico para los cultivos recomendados si se sigue las recomendaciones dadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

VERSIÓN: 03-HZ
ÚLTIMA REVISIÓN: 31-10-12

2000

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO
ADVERTENCIA: USO PERMITIDO SÓLO EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AUTORIZADOS

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	mL/200L	L/ha		
Mandarina	Ácaro del tostado	<i>Phyllocoptruta oleivora</i>	50-60	0.15-0.18	7	0.05
Pimiento	Ácaro hialino	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	150	0.3	0	0.05
	Gusano perforador	<i>Heliothis virescens</i>	125	0.25	0	0.05
Tomate	Pollia	<i>Tuta absoluta</i>	125	0.25	3	0.05

P.C.: Período de carencia

L.M.R.: Límites máximos de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: CERTERO 240 SC Puede variar de acuerdo a la incidencia de la plaga y daño en el cultivo (realizar monitoreo), también dependerá de la etapa de desarrollo del cultivo.

MODO DE ACCIÓN: Es de contacto e ingestión y también tiene actividad translaminar.

MECANISMO DE ACCIÓN: CERTERO 240 SC es un inhibidor de la fosforilación oxidativa, impidiendo la formación de la molécula energética ATP causando muerte celular y finalmente de la plaga.

COMPATIBILIDAD: CERTERO 240 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con los ácidos fuertes, productos alcalinos y agentes oxidantes.

FITOTOXICIDAD: CERTERO 240 SC no es fitotóxico para los cultivos recomendados si se emplea bajo las condiciones indicadas en esta etiqueta.

EFFECTO SOBRE OTROS CULTIVOS: No tienen efectos sobre otros cultivos.

EFFECTO SOBRE CULTIVOS SUCESIVOS: No se han reportado efectos sobre cultivos sucesivos.

MÉTODO DE APLICACIÓN: Aspersión dirigida al follaje de las plantas tratadas

NÚMERO Y FRECUENCIA DE LA APLICACIONES: Se recomienda no realizar más de tres aplicaciones por campaña.

EQUIPO DE APLICACIÓN: CERTERO 240 SC es un insecticida de aplicación foliar. Puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre, puede utilizarse mochilas a palanca, motor, etc.

PERÍODO DE REENTRADA: 24 horas.

PERÍODO DE CARENCIA: 7 días.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO, MANTÉNGASE BAJO LLAVE
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

CERTERO®
240SC

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSION CONCENTRADA - SC


Reg. PQUA N° 295-SENASA

COMPOSICIÓN:

Chlorfenvinphos 240 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Nombre común (ISO)
Nombre químico (IUPAC)
Fórmula estructural

4-bromo-2-[4-chlorophenyl]-1-(ethoxymethyl)-5-trifluoromethyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile
Chlorfenvinphos



Fórmula empírica
Peso molecular
Grupo químico
Propiedades físicas y químicas
Apariencia
Acidez
Densidad
Inflamabilidad
Explosividad
Corrosividad

C₁₇H₁₄BrClF₃N₃O
330.89
Pyrazole
Líquido amarillito
5.0 - 8.0
1.12 g/ml a 20°C
Inflamable
No es explosivo
No es corrosivo

Capacidad y clase de los envases en los que se comercializa el producto
Presentaciones de 0.25, 0.50 y 1.00 L, en envases de PEHD

Titular del Registro
NEOAGRUM S.A.C.

Titular del Registro, importado y distribuido por:
NEOAGRUM S.A.C.

neogrum

Calle Cantuarias 270 Of. 1901 - Miraflores - Lima
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Formulado por:
SINOHEM AGRO CO., LTD.
17-19 th Floor, N°33, He Nan Road(S)
Shanghai, 200002
CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑO



INFORMACIÓN RELATIVA A LA SEGURIDAD:

- Lea esta hoja informativa antes de usar el producto.
- Manténgase bajo llave y fuera del alcance de los niños.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimento o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- El producto es irritante para los ojos, piel y aparato respiratorio.
- El producto puede ser mortal si se ingiere. Es nocivo por ingestión, contacto con la piel o por inhalación.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

ALMACENAMIENTO:

- No almacenar en casa habitación. No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas (guantes, delantal, careta, gafas, etc.).
- Conserve el producto en envase original, etiquetado y cerrado. No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

- Equipo de protección personal: para las personas encargadas de la preparación, mezcla y los aplicadores, así como para aquellos que ingresan al campo antes de transcurridas 24 horas de la aplicación, se recomienda el uso de una camisa manga larga, y pantalones largos o un traje de trabajo que cubra todas las partes del cuerpo a excepción de la cabeza, manos y pies.

Usar guantes resistentes a sustancias químicas, zapatos, calcetines, anteojos o máscara.

Durante la mezcla o carga, un delantal resistente a sustancias químicas.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Pyrazole
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca, y si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No se conoce antídoto específico. Tratamiento es sintomático.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC: 617-6400

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para abejas y otros artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración.
- Peligroso para peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua o zonas no objetivo de al menos 5 metros.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Evite el uso de productos en zonas con napas freáticas superficiales o suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE ENVASES Y EQUIPOS DE APLICACIÓN:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑO



CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO
ADVERTENCIA: USO PERMITIDO SÓLO EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AUTORIZADOS

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	mL/200L	L/ha		
Mandarina	Acaro del tostado	<i>Phyllocoptruta oleivora</i>	50-60	0.15-0.18	7	0.05
Pimiento	Acaro hialino	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	150	0.3	0	0.05
	Gusano perforador	<i>Heliothis virescens</i>	125	0.25	0	0.05
Tomate	Polilla	<i>Tuta absoluta</i>	125	0.25	3	0.05

P.C.: Período de carencia

L.M.R.: Límites máximos de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: CERTERO 240 SC Puede variar de acuerdo a la incidencia de la plaga y daño en el cultivo (realizar monitoreo), también dependerá de la etapa de desarrollo del cultivo.

MODO DE ACCIÓN: Es de contacto e ingestión y también tiene actividad translaminar.

MECANISMO DE ACCIÓN: CERTERO 240 SC es un inhibidor de la fosforilación oxidativa, impidiendo la formación de la molécula energética ATP causando muerte celular y finalmente de la plaga.

COMPATIBILIDAD: CERTERO 240 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con los ácidos fuertes, productos alcalinos y agentes oxidantes.

FITOTOXICIDAD: CERTERO 240 SC no es fitotóxico para los cultivos recomendados si se emplea bajo las condiciones indicadas en esta etiqueta.

EFFECTO SOBRE OTROS CULTIVOS: No tienen efectos sobre otros cultivos.

EFFECTO SOBRE CULTIVOS SUCEIVOS: No se han reportado efectos sobre cultivos sucesivos.

MÉTODO DE APLICACIÓN: Aspersión dirigida al follaje de las plantas tratadas

NUMERO Y FRECUENCIA DE LA APLICACIONES: Se recomienda no realizar mas de tres aplicaciones por campaña.

EQUIPO DE APLICACIÓN: CERTERO 240 SC es un insecticida de aplicación foliar. Puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre, puede utilizarse mochilas a palanca, motor, etc.

PERIODO DE REENTRADA: 24 horas.

PERIODO DE CARENIA: 7 días.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO, MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

CERTERO®
240SC

INSECTICIDA AGRÍCOLA
SUSPENSION CONCENTRADA - SC


Reg. PQUA N° 295-SENASA

COMPOSICIÓN:

Chlorfenapyr 240 g/L
Aditivos c.s.p 1 L

Nombre común (ISO)
Nombre químico (IUPAC)
Fórmula estructural

4-bromo-2-[4-chlorophenyl]-1-[ethoxymethyl]-5-trifluoromethyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile
Chlorfenapyr



Fórmula empírica
Peso molecular
Grupo químico
Propiedades físicas y químicas
Apariencia
Acidez
Densidad
Inflamabilidad
Explosividad
Corrosividad

C₁₇H₁₀BrClF₃N₂O
350.89
Pirazole
Líquido amarillo
5.0 - 8.0
1.12 g/ml a 20°C
Inflamable
No es explosivo
No es corrosivo

Capacidad y clase de los envases en los que se comercializa el producto.
Presentaciones de: 0.25, 0.50 y 1.00 L en envases de PEHD

Titular del Registro
NEOGRUM S.A.C.

Titular del Registro, importador y distribuidor por:
NEOGRUM S.A.C.

neogrum

Calle Centurias 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima
Teléfonos: 617-6400 / Fax: 617-6401

Formulado por:
SINOCEM NINGBO LTD.
21 Jiangda St. Ningbo 315000
CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑO



INFORMACIÓN RELATIVA A LA SEGURIDAD:

- Lea esta hoja informativa antes de usar el producto.
- Manténgase bajo llave y fuera del alcance de los niños.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimento o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- El producto es irritante para los ojos, piel y aparato respiratorio.
- El producto puede ser mortal si se ingiere. Es nocivo por ingestión, contacto con la piel o por inhalación.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

ALMACENAMIENTO:

- No almacenar en casa habitación. No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas (guantes, delantal, careta, gafas, etc.).
- Conservarse el producto en envase original, etiquetado y cerrado. No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

- Equipo de protección personal: para las personas encargadas de la preparación, mezcla y los aplicadores, así como para aquellos que ingresan al campo antes de transcurridas 24 horas de la aplicación, se recomienda el uso de una camisa manga larga, y pantalones largos o un traje de trabajo que cubra todas las partes del cuerpo a excepción de la cabeza, manos y pies.

Usar guantes resistentes a sustancias químicas, zapatos, calcetines, anteojos o máscara.

Durante la mezcla o carga, un delantal resistente a sustancias químicas.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Pirazole
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca, y si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No se conoce antídoto específico. Tratamiento es sintomático.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC: 617-6400

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para abejas y otros artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración.
- Peligroso para peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua o zonas no objetivo de al menos 5 metros.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Evite el uso de productos en zonas con napas freáticas superficiales o suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE ENVASES Y EQUIPOS DE APLICACIÓN:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑO



CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO
ADVERTENCIA: USO PERMITIDO SÓLO EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AUTORIZADOS

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	mL/200L	L/ha		
Mandarina	Ácaro del tostado	<i>Phyllocoptruta oleivora</i>	50-60	0.15-0.18	7	0.05
Pimiento	Ácaro hialino	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	150	0.3	0	0.05
	Gusano perforador	<i>Heliothis virescens</i>	125	0.25	0	0.05
Tomate	Pollita	<i>Tuta absoluta</i>	125	0.25	3	0.05

P.C.: Período de carencia

L.M.R.: Límites máximos de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: CERTERO 240 SC Puede variar de acuerdo a la incidencia de la plaga y daño en el cultivo (realizar monitoreo), también dependerá de la etapa de desarrollo del cultivo.

MODO DE ACCIÓN: Es de contacto e ingestión y también tiene actividad translaminar.

MECANISMO DE ACCIÓN: CERTERO 240 SC es un inhibidor de la fosforilación oxidativa, impidiendo la formación de la molécula energética ATP causando muerte celular y finalmente de la plaga.

COMPATIBILIDAD: CERTERO 240 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con los ácidos fuertes, productos alcalinos y agentes oxidantes.

FITOTOXICIDAD: CERTERO 240 SC no es fitotóxico para los cultivos recomendados si se emplea bajo las condiciones indicadas en esta etiqueta.

EFFECTO SOBRE OTROS CULTIVOS: No tienen efectos sobre otros cultivos.

EFFECTO SOBRE CULTIVOS SUCEIVOS: No se han reportado efectos sobre cultivos sucesivos.

MÉTODO DE APLICACIÓN: Aspersión dirigida al follaje de las plantas tratadas

NÚMERO Y FRECUENCIA DE LA APLICACIONES: Se recomienda no realizar más de tres aplicaciones por campaña.

EQUIPO DE APLICACIÓN: CERTERO 240 SC es un insecticida de aplicación foliar. Puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre, puede utilizarse mochilas a palanca, motor, etc.

PERÍODO DE REENTRADA: 24 horas.

PERÍODO DE CARENIA: 7 días.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO, MANTÉNGASE BAJO LLAVE
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

CERTERO®

240SC

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSION CONCENTRADA - SC


Reg.PQUA N° 295-SENASA

COMPOSICIÓN:

Chlorfenvapyr 240 g/L
Aditivos c.a.p. 1 L

Nombre común (ISO)
Nombre químico (IUPAC)
Fórmula estructural

4-bromo-2-[4-chlorophenyl]-1-(ethoxymethyl)-5-trifluoromethyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile
Chlorfenvapyr



Fórmula empírica
Peso molecular
Grupo químico
Propiedades físicas y químicas
Apariencia
Acidez
Densidad
Inflamabilidad
Explosividad
Corrosividad

$C_{17}H_{14}BrClF_3N_4O$
350.89
Pyrazole
Líquido amarillento
5.0 - 8.0
1.12 g/mL a 20°C
Inflamable
No es explosivo
No es corrosivo

Capacidad y clase de los envases en los que se comercializa el producto.
Presentaciones de: 0.25, 0.50 y 1.00 L, en envases de PEHD

Titular del Registro
NEOAGRUM S.A.C.

Formulado por:
HANGZHOU CHANGHE AGRICULTURAL CHEMICAL CO., LTD
84 Riverside Wharf Road, Changhe Town, Hangzhou,
Zhejiang Province
CHINA

Titular del Registro, Importado y distribuido por:
NEOAGRUM S.A.C.

neagrums

Calle Cantuarias 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



INFORMACIÓN RELATIVA A LA SEGURIDAD:

- Lea esta hoja informativa antes de usar el producto.
- Manténgase bajo llave y fuera del alcance de los niños.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimento o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- El producto es irritante para los ojos, piel y aparato respiratorio.
- El producto puede ser mortal si se ingiere. Es nocivo por ingestión, contacto con la piel o por inhalación.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

ALMACENAMIENTO:

- No almacenar en casa habitación. No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas (guantes, delantal, careta, gafas, etc.).
- Conservarse el producto en envase original, etiquetado y cerrado. No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Equipo de protección personal: para las personas encargadas de la preparación, mezcla y los aplicadores, así como para aquellos que ingresan al campo antes de transcurridas 24 horas de la aplicación, se recomienda el uso de una camisa manga larga, y pantalones largos o un traje de trabajo que cubra todas las partes del cuerpo a excepción de la cabeza, manos y pies.
- Usar guantes resistentes a sustancias químicas, zapatos, calcetines, anteojos o máscara.
- Durante la mezcla o carga, un delantal resistente a sustancias químicas.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Pyrazole
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca, y si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No se conoce antídoto específico. Tratamiento es sintomático.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC: 617-6400

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para abejas y otros artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración.
- Peligroso para peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua o zonas no objetivo de al menos 5 metros.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Evite el uso de productos en zonas con napas freáticas superficiales o suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE ENVASES Y EQUIPOS DE APLICACIÓN:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

