

LEA LA ETIQUETA (Y LA HOJA DE SEGURIDAD) ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar aspersión.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- **Grupo químico: Pirazole**
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca, y si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No se conoce antídoto específico. Tratamiento es sintomático.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**  
CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEOAGRUM SAC: 617-6400

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- "Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase."
- "Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado."



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para las abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para este fin.

# CERTERO<sup>®</sup>

## 240SC

**INSECTICIDA - ACARICIDA AGRÍCOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC**

**COMPOSICIÓN:**

Chlorfenapyr..... 240 g/L  
Aditivos..... c.s.p. 1 L

**Reg. PQUA N° 295 - SENASA**  
**Titular del Registro, Importado y Distribuido por:**  
**NEOAGRUM S.A.C.**



Calle Cantuarias 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima  
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

**Contenido neto: 1 L**

N° de Lote:  
F. de Form.: "ver parte superior"  
F. de Venc.:

Formulado por:  
SINOCHEN NINGBO. LTD.  
21 Jiangxia St. Ningbo 315000.  
CHINA

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO**  
**DAÑINO**



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**CERTERO 240 SC** actúa por contacto e ingestión y también tiene actividad translaminar. Es utilizado para el control de *Tuta absoluta* en tomate, *Phyllocoptruta oleivora* en naranjo y mandarina, *Polyphagotarsonemus latus* y *Heliothis virescens* en pimiento.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**CUADRO DE USOS**

| CULTIVO   | PLAGAS            |                                  | DOSIS   |           | P.C.   | L.M.R |
|-----------|-------------------|----------------------------------|---------|-----------|--------|-------|
|           | Nombre Común      | Nombre Técnico                   | mL/200L | L/ha      | (días) | (ppm) |
| Mandarina | Ácaro del tostado | <i>Phyllocoptruta oleivora</i>   | 50-60   | 0.15-0.18 | 7      | 0.05  |
| Naranja   | Ácaro del tostado | <i>Phyllocoptruta oleivora</i>   | 50-60   | ---       | 14     | 0.5   |
| Pimiento  | Ácaro hialino     | <i>Polyphagotarsonemus latus</i> | 150     | 0.30      | 0      | 0.05  |
|           | Gusano perforador | <i>Heliothis virescens</i>       | 125     | 0.25      | 0      | 0.05  |
| Tomate    | Polilla           | <i>Tuta absoluta</i>             | 125     | 0.25      | 3      | 0.05  |

P.C.: Periodo de Carencia L.M.R.: Límites máximos de residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Iniciar el tratamiento químico a la aparición de la plaga en el cultivo. Realizar máximo una aplicación por campaña, considerando 2 campañas al año.

**PERIODO DE REINGRESO:**

Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de las 24 horas después de la aplicación

**COMPATIBILIDAD:** **CERTERO 240 SC** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con los ácidos fuertes, productos alcalinos y agentes oxidantes.

**FITOTOXICIDAD:** **CERTERO 240 SC** no es fitotóxico para los cultivos recomendados si se sigue las recomendaciones dadas en la etiqueta

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.