

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

- No comer, no beber, ni fumar durante y después de la aplicación sin haberse lavado con agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- El producto es nocivo por ingestión y contacto con la piel.
- Usar lentes protectores y respirador cuando se manipule el producto.
- No utilice este envase para conservar alimentos o agua.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- Teléfonos de Emergencia: CICOTOX : 0800-1304
Insumos Agrícolas Peruanos S.A.C: 01 422 5900

- Antídotos: no hay antídoto específico.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- No disponer los envases con residuos municipales.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Utilizar una banda de protección hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en épocas de floración.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.

FORTIS[®] 10CE

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICION:

Alfacipermetrina..... 100 g/l
Aditivos c.s.p 1 L

Reg. PQUA N°108-SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

INSUMOS AGRICOLAS PERUANOS S.A.C
Calle Jorge Vanderghen N° 315 Miraflores
Lima-Perú
Teléfono: (511) 4225900

FORMULADO POR:

Nantong Dading Chemical Co., LTD
N°1 Tonghai Road,
Rudong Yankou
Chemical Industri Zone
Tel.: +86 (0) 513-81903406

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

AGROSURPE S.R.L.
C.A. prolongación Miguel Grau N° 112 Tiabaya
Arequipa-Perú
Teléfono: 959055270

CONTENIDO NETO: 500 ml

Lote No.:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

INFLAMABLE



NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FORTIS 10CE es un insecticida Piretroide que actúa por contacto e ingestión, empleado en el control de las plagas recomendadas en esta etiqueta. Para su preparación, llenar con agua hasta la mitad el tanque de aplicación, agregar la dosis recomendada y remover, finalmente completar con agua la capacidad total del tanque, remover y aplicar. Realizar la aplicación con equipo de aspersión manual o mecánico tratando de efectuar una aplicación uniforme.

Se recomienda que diluido el producto, no puede ser almacenado por más de 12 horas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivos	Plaga		Dosis ml/200 L	Periodo de Carencia (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico			
Alfalfa	Gusano ejercito	<i>Spodoptera spp.</i>	125	14	0,5
Algodón	Gusano rosado	<i>Pectinophora gossypiella</i>	125	14	0,1
	Arrebiatado	<i>Dysdercus peruvianus</i>	125	14	0,1
Col	Gusano de hoja	<i>Plutella spp</i>	125	14	1
Frijol	Gusano medidor	<i>Pseudoplusia spp</i>	150	14	0,05
Maíz	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	125	14	0,05
Papa	Mosca minadora (adultos)	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	100	14	0,05
Sandía	Perforador de guias	<i>Diaphania spp</i>	125	14	0,05
Tomate	Polilla	<i>Tuta absoluta</i>	150	14	0,1

LMR= Límite máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN. - Se recomienda aplicar cuando se observe las primeras posturas y/o larvas.

Numero máximo de aplicaciones: 4 campaña/año

PERIODO DE REINGRESO. - Como mínimo 24 horas.

COMPATIBILIDAD. - No compatible con materiales de alta acidez o alcalinidad.

FITOTOXICIDAD. - No es fitotóxico usado a la dosis recomendada en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL. - El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**



Marca ● Pantone 1785C
Fire ● Pantone RED 032C
Estrella Point ● Pantone 354C
Banda ● Pantone Yellow C