

21 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, no beber ni fumar durante y después de la aplicación sin haberse lavado con agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cambíese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manejo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- El producto es nocivo por ingestión y contacto con la piel.
- Usar lentes protectores y respirador cuando se manipule el producto.
- No utilice este envase para conservar alimentos o agua.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106; INAP: (01) 499-7831

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Insecticida piretroide
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- Antídotos: no hay antídoto específico.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice lo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- **Utilizar una banda de protección hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.**
- **Peligroso para abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en épocas de floración.**
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.

FORTIS® 10CE

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

Alpha-cypermethrin..... 100 g/L
 Aditivos c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° 108 - SENASA



Titular de Registro:

INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.C.
 Calle Los Tulipanes 147 Oficina 701 B.
 Santiago de Surco, Lima - Perú.
 Teléfono: (01) 499-7831

Formulado por:

Nantong Dading Chemical Co., Ltd.
 N°1 Tonghai Road, Rudong Yankou
 Chemical Industrial Zone, China

Importador y Distribuidor:

HEROW CHEMICALS S.A.C.
 Av. Tacna Nro. 1770 P.J.
 Hector Aurich Soto
 Ferreñafe, Lambayeque
 Telefono: +51 979280030

Contenido Neto: 500 ml

N° de Lote:
 Fecha de Formulación:
 Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO



INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
 DAÑINO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FORTIS 10 CE, es un insecticida Piretroide, que actúa por contacto e ingestión, empleado en el control de las plagas recomendadas en esta etiqueta. Para su preparación, llenar con agua hasta la mitad el tanque de aplicación, agregar la dosis recomendada y remover, finalmente completar con agua la capacidad total del tanque, remover y aplicar. Realizar la aplicación con equipo de aspersión manual o mecánico tratando de efectuar una aplicación uniforme.

Se recomienda que diluido el producto, no puede ser almacenado por más de 12 horas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	PLAGA		DOSIS ml/200L	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Alfalfa	Cogollero	<i>Spodoptera sp</i>	125	14	0.5
Algodón	Husno mojado de la India	<i>Pectinophora gossypiella</i>	125	14	0.1
	Arrebatado	<i>Dysdercus peruvianus</i>	125	14	0.1
Col	Gusano de la Col	<i>Plutella spp</i>	125	14	1
Frijol	Gusano medidor o pejerrey	<i>Chrysobothris (=Pezomachus) spp</i>	150	14	0.05
Maíz	Gusano Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	125	14	0.05
Papa	Mosca minadora (adultos)	<i>Leptomyza haldobrensis</i>	100	14	0.05
Sandía	Barranador de frutos y guías	<i>Diaphania spp.</i>	125	14	0.05
Tomate	Oruga miradora de hoja y tallo	<i>Tuta (=Scrobipalpus) absoluta</i>	150	14	0.1

PC: Período de carencia

LMR: Límite máximo de residuos (partes por millón)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar cuando se observe las primeras posturas y/o larvas. Número máximo de aplicaciones: 4 campañas/año

PERÍODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

No compatible con materiales de alta acidez o alcalinidad.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



12 cm