

PRIMEROS AUXILIOS**Grupo químico: Piretroides.**

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y esta hoja informativa.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

Teléfonos de Emergencia:
CICOTOX: 328 7700
ESSALUD: 411 8000 opción 4
CISPROQUIM: 0800 50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos, no contaminar lagos, ríos, estanques y fuentes de agua con desechos y envases vacíos ni con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Peligroso para las abejas y nocivo para la fauna benéfica.
- No aplicar en época de floración.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico : Líquido
Color : Ambar o marrón claro
Olor : A solvente aromático
pH : 7
Densidad : 1.02 - 1.12 g/ml
Producto : No inflamable

PRESENTACIONES COMERCIALES:

250ml, 500ml, 1 L, 20 L, 200 L.



Point
ENTREGAMOS CALIDAD

Importado y Distribuido por:
SILVESTRE PERÚ S.A.C.
Calle Arica 242 Miraflores, Lima 18 - Perú.
Tel.: (01) 617-3300



Titular del Registro:
POINT ANDINA S.A.
Calle Loreto N° 304,
Urbanización Santa Patricia II Etapa
La Molina, Lima - Perú
Teléfonos: (1) 348-1018 / 349-9609

Formulado por:
POINT INTERNATIONAL LTD.
42 St Margarets Grove Twickenham
TW 1 1JG United Kingdom
Teléfono: (44-20) 88923862

DERRIBE [®] **50 EC**

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC
Reg. PQUA N° 117 - SENASA


COMPOSICIÓN:

Permethrin 500 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Grupo químico: Piretroides

Nombre químico(IUPAC):
Cyclopropanecarboxylic acid,
3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-,
(3-phenoxyphenyl)methyl ester.

Fórmula empírica, peso molecular
C₂₁H₂₆Cl₂O₃
PM=319.30

Fórmula estructural

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

NO INFLAMABLE



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

**LEA LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

"MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Usar máscara, guantes y gafas protectoras durante el manejo del producto.
- Guardar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un ambiente seco, sombreado y ventilado.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Después de usar el producto, cambiarse de ropa y bañarse con abundante agua y jabón.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel o por inhalación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Irritante a la piel y a los ojos.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

DERRIBE 50 EC® es un insecticida piretroide de rápida acción que actúa por contacto e ingestión.
DERRIBE 50 EC® se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila, según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS Y ROPA DE PROTECCIÓN

Para preparar la mezcla, utilizar guantes y botas de goma, delantal, tapabocas y careta de protección. Durante la aplicación, utilizar guantes y botas de goma, overol, máscara o respirador, gafas y gorro.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Las aplicaciones pueden repetirse a los 14 días en caso de reinfestación. Se puede aplicar en cualquier etapa fisiológica del cultivo, hasta los 7 días antes de la cosecha. Máximo dos aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO:

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

EFFECTOS SOBRE OTROS CULTIVOS

No tiene efecto sobre otros cultivos.

EFFECTO SOBRE CULTIVOS SUCESIVOS Y/O SUSCEPTIBLES

No se han reportado efectos sobre otros cultivos ni susceptibilidad

COMPATIBILIDAD : DERRIBE 50 EC® es compatible con la mayoría de insecticidas y plaguicidas de uso agrícola excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico usado a las dosis recomendadas en la etiqueta

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| CULTIVO | PLAGA | | DOSIS | | PC (días) | LMR (ppm) |
|-----------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------|-----------|-----------|
| | NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO | ml / cilindro 200 L | L / ha | | |
| Alcachofa | "Gusano perforador" | <i>Heliothis virescens</i> | 200-250 | 0.4-0.5 | 0 | 5 |
| Alfalfa | "Gusano ejército" | <i>Spodoptera eridania</i> | 100 | 0.2 | 7 | 25 |
| Cebolla | "Trips" | <i>Thrips tabaci</i> | 100-150 | 0.2-0.3 | 1 | 0.1 |
| Espárrago | "Gusano del túrion" | <i>Copitarsia decolora</i> | 250 | 0.5 | 1 | 1 |
| Páprika | "Gusano defoliador" | <i>Spodoptera frugiperda</i> | 200-250 | 0.4-0.5 | 3 | 10 |
| Tomate | "Polilla" | <i>Tuta absoluta</i> | 150 | 0.3 | 7 | 1 |

LMR: Límite Máximo de Residuos

PC: Período de Carencia

Volumen de agua recomendado: 400 L/ha

