

1 cm

27.5 cm

1 cm

1 cm

Revelacion 40WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN

Myclobutanil 400 g/kg
Aditivos c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N°469 - SENASA



Titular de Registro, Importado y Distribuido por:
POINT ANDINA S.A.

Calle Loreto 304 Urbanización Santa Patricia II Etapa. La Molina. Lima Perú
Teléfono: 3481018 - 3499609

Formulado por:
POINT INTERNATIONAL LTD.
42 St Margarets Grove Twickenham
TW 1 1JG United Kingdom
Teléfono: (44-20) 88923862

Contenido neto: **1kg**
Número de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:


NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

PANTONES



LOGO POINT



BANDA TOXICOLÓGICA



C:100 M:90 Y:0 K:0



C:52 M:48 Y:0 K:0

LOGO REVELACION 40 WP

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO “MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Causa irritación moderada a los ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto en un lugar bajo techo, fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Triazol
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con agua por 15 a 20 minutos, remover los lentes de contacto si los hubiera. Si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión no inducir al vómito, beber y enjuagar la boca con abundante agua. No administrar nada a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y enjuagar la piel con abundante agua por 15 a 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar ventilado. Si la persona tienen dificultad para respirar, dar respiración artificial.

En caso de emergencias llamar a:
CICOTOX: 328 7700 ; ESSALUD: 411 8000 opción 4

CISPROQUIM: 0800 50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido inutilice este envase triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contamine las fuentes de agua con los restos de la

aplicación o sobrantes del producto.

- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna, flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas fráticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoja el producto y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

REVELACIÓN 40 WP es un fungicida sistémico de acción preventiva y curativa. Para su aplicación, llenar con agua hasta la mitad el tanque de aplicación, luego agregar la dosis recomendada, completar con agua, agitar y aplicar. Realizar la aplicación con equipo de dispersión manual o mecánico.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC días	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	g/200L	kg/ha		
Alcachofa	"Oidium"	<i>Leveillula taurica</i>	100-150	-	5	0.05
Arroz	"Pyricularia"	<i>Pyricularia oryzae</i>	100-150	-	15	0.03
Cebolla	"Alternariosis"	<i>Alternaria porri</i>	100-150	0.18-0.30	7	0.06
Espárrago	"Roya"	<i>Puccinia asparagi</i>	100	-	14	0.03
Pimiento	"Oidium"	<i>Leveillula taurica</i>	-	0.4*	3	1
Vid	"Oidium"	<i>Erysiphe necator</i>	-	0.25	14	1
Zapallo	"Oidium"	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	50-60	-	0	0.20

PC: Periodo de Carencia LMR: Límite Máximo de Residuos (partes por millón)
*Gasto de agua 400 L

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda un máximo de 2 aplicaciones por campaña por año, cuando se observe los primeros síntomas de la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO:

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

REVELACIÓN 40 WP es compatible con la gran mayoría de los pesticidas de uso agrícola, excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:

REVELACIÓN 40 WP no es fitotóxico siempre que se use de acuerdo a las recomendaciones dadas en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en las etiquetas y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas"



1 cm