TORNADO WP

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Abamectin..... 5 g/kg

Bacillus thuringiensis var. *kurstaki*.....15 g/kg

Aditivos csp.....1.0 kg

Registro PQUA N° 313 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

AGRIMORPHO SAC
Mz. 3 - Lt. 8 - Urb. Jardines del Golf, Víctor Larco Herrera, Trujillo - La Libertad, Perú
Telf.: 044-289877 - Nextel: 831*5780
ventas@agrynova.com

FORMULADO POR:

JINAN FUSEN BIO-CHEMICALS CO., LTD
403, Nº 1728, Second Ring Cast Road, Jinan City, Shandong, China.
Tel. 0086- 531- 58837128

IMPORTADOR:

AGrynova
Valor e Innovación...
... la nueva agricultura!

Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Contenido Neto : **1 Kg**
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

TORNADO WP

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Abamectin..... 5 g/kg

Bacillus thuringiensis var. *kurstaki*.....15 g/kg

Aditivos csp.....1.0 kg

Registro PQUA N° 313 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

AGRIMORPHO SAC
Mz. 3 - Lt. 8 - Urb. Jardines del Golf, Víctor Larco Herrera, Trujillo - La Libertad, Perú
Telf.: 044-289877 - Nextel: 831*5780
ventas@agrynova.com

FORMULADO POR:

SHANDONG LUKANG BIOLOGICAL PESTICIDES CO., LTD
No 1 Qilu Street, Qihe County, Shandong Province, China 251100
Tel. 0534-5332296 / 5337908

IMPORTADOR:

AGrynova
Valor e Innovación...
... la nueva agricultura!

Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Contenido Neto : **1 Kg**
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

“LEA TOTALMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

-No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.

-Utilice guantes, botas, respirados y ropa de protección para prevenir la exposición durante la preparación y aplicación.

-No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

-Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.

PRIMEROS AUXILIOS:

-Grupo químico: Lactona macrociclica

-Evite la inhalación y el contacto con los ojos, la piel o heridas abiertas.

-En caso de inhalación retire a la persona del área contaminada hacia una zona de aire fresco. Conseguir atención médica de inmediato.

-En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y acudir al médico.

-Si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

-El producto no tiene antídoto especifico. Realizar tratamiento sintomático.

-En caso de emergencia llamar a:

CICOTOX: 0800-13040(Atención 24 horas) ó
ESSALUD EN LINEA: 0801-10200
CISPROQUIM: 080-050-847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

-Después de usar el contenido destruya este envase y depositelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

-Tóxico para las abejas y otros artrópodos benéficos, evitar la aplicación en época de floración.

-Peligroso para los organismos acuáticos.

-No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

-No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

-Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.

-Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.

-El aplicador debe de emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

-En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

TORNADO WP, es un insecticida a base de endotoxinas y esporas de la bacteria *Bacillus thuringiensis var. kurstaki,* y abamectina las cuales al ser aplicadas sobre diversos cultivos controla estadios larvales de lepidopteros comedores de follaje.

Preparación de la mezcla:

a-En 3 a 5 litros de agua diluir la dosis requerida de coadyuvante.

b-En la premezcla (a) diluir la dosis indicada de **TORNADO WP** y agitar muy bien.

c-Llevar la mezcla (b) hasta el volumen final de aplicación requerido.

Es recomendable usarse todo el producto premezclado antes de las 5 horas siguientes.

“CONSULTE UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USO Y DOSIS

Cultivo	Plagas		Dosis		PC	LMR
	Nombre común	Nombre científico	kg/Ha	kg/200L		
Espárrago	Gusano ejército	*Spodoptera frugiperda*	0.70 - 0.875	0.20 - 0.35	1	0.01
Pimiento	Gusano de la bellota	*Heliothis virescens*	0.25 - 1.2	0.20 - 0.30	3	0.02
Palto	Bicho del cesto	*Oiketicus kirbyi*	-	0.20 - 0.30	1	0.02
Holantao	Gusano ejército	*Spodoptera eridania*	0.35 - 1.26	0.25 - 0.35	3	0.01

PC: Período de carencia en días
LMR: Límite máximo de residuos en ppm

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN:

Para el cultivo de espárrago, realizar dos aplicaciones por campaña y al inicio de las infestaciones.
Para el cultivo de palto, se recomienda iniciar la aplicación cuando las infestaciones sean leves a moderadas. Aplicar como máximo dos aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO:

24 horas

COMPATIBILIDAD:

TORNADO WP no se debe mezclar con productos alcalinos (productos con contenido de calcio) ni con aguas duras o con pH alcalino.

FITOTOXICIDAD:

No se observan efectos de fitotoxicidad si se usa de acuerdo a las indicaciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las indicaciones e instrucciones dadas.”