neoagrum	**ETIQUETA**	**Revisión: 00**
	GALBEN 73 - NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO. LTD.	**Aprobado: JR** **Fecha: 17-08-2020** **Página: 3 de 5**

13.0 -/+ 0.3 cm

19 -/+ 0.3 cm

GALBEN 73®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN:

Benalaxil ..... 80 g/kg
Mancozeb.....650 g/kg
ETU ..... 0.38 g/kg
Aditivos .....c.s.p.1 kg

Reg. PQUA N° 174 - SENASA

Titular del Registro, Importado y Distribuido por:
NEOAGRUM S.A.C.

neoagrum

Pj. Camino de Acceso N° 02 - Urb. Parcelación Cajamarquilla
Lurigancho - Lima - Perú. Teléfono: 617-6400

Contenido neto: 500 g

Nº de Lote:
F. de Form.:
F de Venc.:

Formulado por:
NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO. LTD.
Xiepu Town, Zhenhai District, Ningbo,
Zhejiang Province. China

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

2.8 cm

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
- Este producto es tóxico si se ingiere o es inhalado. Evite el contacto con la piel y ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento y no aplicar a velocidad de viento mayor a 10 km/h.
- No aplicar a una temperatura mayor a 30°C ni a una humedad relativa menor a 50%.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimento o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS:
- **Grupo químico Phenilamidas: Benalaxil**
- **Grupo químico Ditiocarbamatos: Mancozeb**
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta y/o hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX: 328-7700
ESSALUD: 411-8000 (opción 4)
CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
- Después de usar el contenido, destruya el envase y depósitelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:
- Nocivo para el ganado. Manténganlo fuera de las zonas tratadas, al menos durante 1 día después de la aplicación.
- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. Tóxico para organismos acuáticos.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
GALBEN 73® es un fungicida de doble acción. Por su acción sistémica llega y protege todos los órganos de las plantas (yemas, hojas y tallos herbáceos). Su acción de contacto, inhibe el desarrollo del hongo en la superficie de los órganos de la planta.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Llene hasta la mitad el cilindro o tanque con agua y vierta la dosis recomendada de **GALBEN 73®**, agítese, complete el agua y vuélvase a agitar.
Las plantas deben mojarse por completo sin llegar al escurrimiento, previa calibración de los equipos de aplicación.
Iniciar las aplicaciones ante la presencia de condiciones ambientales favorables para el desarrollo del hongo o de los primeros síntomas de la enfermedad en los cultivos.
Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña para los cultivos objetivos.

PERIODO DE REINGRESO:
Puede reingresar al campo 24 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

COMPATIBILIDAD:
GALBEN 73® es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aguas carbonatadas y productos de reacción alcalina. Se recomienda realizar una prueba previa de la compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:
GALBEN 73® no es fitotóxico en los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	P.C.	L.M.R.
	Nombre Común	Nombre Científico	kg / 200 L	(días)	(ppm)
Cebolla	Mildiu	*Peronospora destructor*	0.5 - 0.6	28	0.2
Lechuga	Mildiu	*Bremia lactucae*	0.4	28	0.5
Papa	Hielo o rancha	*Phytophthora infestans*	1.0	28	0.02
Pimiento	Pudrición radicular	*Phytophthora capsici*	0.5	15	0.05
Quinua	Mildiu	*Peronospora farinosa*	0.5	n.d.	n.d.
Tomate	Hielo o rancha	*Phytophthora infestans*	0.4 - 0.6	28	0.5
Vid	Mildiu de la vid	*Plasmopara viticola*	0.5	14	0.1

P.C.: Periodo de carencia n.d.: No determinado L.M.R.: Límite máximo de residuos

TEXTO	LOGO PRODUCTO B.TOXICOLOGICA	LOGO NEOAGRUM		
NEGRO	PANT. 293 C	PANTONE 343 C (C 89/ M 19/ Y 72/ K 60)	PANTONE 377C (C 50/ M 1/ Y 100/ K 20)	Degradé Amarillo Oscuro C 0/ M 45/ Y 100/ K 0 Degradé Amarillo Claro C 0/ M 20/ Y 100/ K 0 AMARILLO OSCURO PANTONE 137C AMARILLO CLARO PANTONE 7406C

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización de GRUPO SILVESTRE