**LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**
**MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**
- Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.
- No comer beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar con productos alimenticios, medicinas, bebidas, forraje.
- Utilizar ropa protectora, guantes botas y máscara durante el manipuleo y aplicación.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento en horas de baja insolación y viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

**PRIMEROS AUXILIOS**
- **Grupo químico:** Triazinas
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele copia de esta etiqueta y hoja informativa adjunta.
- En caso de inhalación lleve a la víctima al aire libre, brindar respiración artificial si es necesario. Acuda a un médico
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca manteniendo el párpado bien abierto por lo menos 15 minutos, acuda a un médico. Si el contacto fuese con la piel retírese la ropa contaminada y la lavese con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, lavar la boca con abundante agua. Acuda a un médico. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- **Nota al médico:** No existe un antídoto específico. Tratamiento sintomático y terapia complementaria.
- **TELÉFONOS DE EMERGENCIA: CICOTOX : 0800- 1-3040; ESSALUD en línea (01) 411-8000 opción 4; ADAMA AGRICULTURE PERÚ S.A.: (01) 641-0000.**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**
- Peligroso para animales domésticos, la fauna y flora silvestre.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame absorber el producto con arena u otro material inerte y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

# Atranex
## 50 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:
Atrazina ..... 500 g/L
Aditivos ..... c.s.p. 1 Litro

Registro N° 288 - 96 - AG- SENASA

Titular del Registro,
Importador y Distribuidor:
**ADAMA Agriculture Perú S.A.**
Av. El Derby N° 254, Of. N° 306,
Santiago de Surco. Lima - Perú.
Teléfono: (01) 641-0000

Formulado por:
**ADAMA Agan Ltd.**
Northern Industrial Zone
P.O. Box 262.
Ashdod 771021, Israel.

Contenido neto: 500 ml

Lote No.
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

ADAMA

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**
**Atranex 50 SC** es un herbicida selectivo del grupo de las triazinas utilizado para el control de un amplio rango de malezas anuales de hoja ancha y gramíneas en pre y post emergencia temprana.
Agite el envase antes de abrir. Utilizar un volumen de agua de 200 - 400 litros por hectárea y boquillas de abanico plano.
Para obtener una actividad herbicida completa y facilitar la absorción del producto es necesaria la presencia de humedad en el suelo, por lo que se debe aplicar durante la estación de lluvias o antes del riego .

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

| CULTIVO | MALEZAS | | DOSIS (L/ha) | P.C. (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre común | Nombre científico | | | |
| CAÑA DE AZÚCAR | Yuyo<br>Hierba gallinazo<br>Amor seco<br>Pata de gallina<br>Lechera<br>Verdolaga<br>Rabo de zorro<br>Chamico<br>Pichana<br>Cerraja<br>Capulí cimarron<br>Mata gusano | *Amaranthus spp.*<br>*Chenopodium spp.*<br>*Bidens pilosa*<br>*Eleusine indica*<br>*Euphorbia spp.*<br>*Portulaca oleracea*<br>*Setaria spp.*<br>*Datura stramonium*<br>*Sida acuta*<br>*Cenchrus oleraceus*<br>*Nicandra physalodes*<br>*Flaveria bidentis* | 1.5 - 2.5 | N.A | 0.20 |
| MAIZ | Yuyo<br>Hierba gallinazo<br>Amor seco<br>Pata de gallina<br>Lechera<br>Verdolaga<br>Rabo de zorro<br>Chamico<br>Pichana<br>Cerraja<br>Capulí cimarron<br>Mata gusano | *Amaranthus spp.*<br>*Chenopodium spp.*<br>*Bidens pilosa*<br>*Eleusine indica*<br>*Euphorbia spp.*<br>*Portulaca oleracea*<br>*Setaria spp.*<br>*Datura stramonium*<br>*Sida acuta*<br>*Cenchrus oleraceus*<br>*Nicandra physalodes*<br>*Flaveria bidentis* | 1.5 - 2.5 | 60 | 0.20 (grano)<br>1.5 (forraje) |

P.C.: Periodo de Carencia LMR : Límite Máximo de Residuos N.A. : No Aplicable

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**
Realizar como máximo dos (02) aplicaciones por campaña.
Aplicar a la pre-emergencia y/o post-emergencia temprana (2 - 4 hojas) de las malezas.
No aplicar en el cultivo de caña de azúcar una vez que el campo haya cerrado.

**PERIODO DE REINGRESO**
Se puede reingresar al área tratada, sin ropa de protección, después de 12 horas de haber aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD**
Ver la Hoja Informativa adjunta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**
El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

Dimensiones reales : 230 mm x 120 mm

Esta etiqueta requiere Hoja Informativa