"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
Durante el manipuleo del producto, no comer, beber, ni fumar.
Evite su contacto con la piel y prolongada inhalación. Use guantes y máscaras protectoras.
No se debe ingerir.
Terminadas las labores, deben lavarse con abundante agua y jabón las partes del cuerpo expuestas al producto y cambiarse de ropa.
No trate de desatorar los equipos soplando con la boca.
No transporte ni almacene este producto junto con comestibles, bebidas o medicinas de uso humano.
Evítese la contaminación de alimentos y medicinas para uso humano y animal, así como semillas, forrajes, fertilizantes, implementos agrícolas, acequias y drenajes.
Las aplicaciones de este producto deben realizarse de acuerdo a la reglamentación de uso de herbicidas.
Destruya este envase inmediatamente después de usar el producto.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Oxadiazole
En caso de presentarse síntomas de intoxicación, llamar al médico, mientras tanto retire al paciente de la labor para que no continúe en contacto con el producto, colocándolo en un lugar bien ventilado, quítarle la ropa y lavar con agua limpia y jabón todas las partes del cuerpo que hubieran sido contaminadas. Enjuagar bien los ojos con bastante agua limpia y fresca.

ANTIDOTO:
No tiene antídoto específico, por lo que el médico instituirá el tratamiento sintomático correspondiente.

TELEFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACION:
CICOTOX: 0800-1-3040 CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y depositelo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:
No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estanques. Aplique el producto como se indica en la etiqueta, no reutilice los envases, destrúyalos.

BAYER

Ronstar® 25 EC

HERBICIDA AGRICOLA

Concentrado Emulsionable (EC)

Oxadiazon, 250g/L
Ingredientes Inertes, 570 g/L

Reg. N° 209-96-AG-SENASA

Titular del Registro:
Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
Piso 10. San Isidro.

Formulado por:
Bayer CropScience S.A
A.A. 80004
Bogotá D.C - Colombia

Importado y Distribuido por:
Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
Piso 10. San Isidro.
Lima - Perú

NO CORROSIVO **NO EXPLOSIVO**
INFLAMABLE

Contenido Neto: 1 litro

Lote N.
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento.

® = Marca Registrada de Bayer AG

GENERALIDADES:
RONSTAR 25 EC es un herbicida pre-emergente selectivo para los cultivos de arroz, cebolla y algodón; que controla malezas gramíneas, de hoja ancha y ciperáceas en estos cultivos.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"

CULTIVO	PLAGAS		l/ha			PC* (días)	LMR** (ppm)
	Nombre Comun	Nombre Técnico	S. directa	Transplante			
Arroz	Moco de pavo Grama tela Pata de gallina Paspalo Plumilla Mazorquilla Digitaria Rabo de zorro Pasto Coco	*Echinochloa cursgalli* *Echinochloa colonum* *Fleusine indica* *Chloris radiata* *Leptochloa uninervia* *Ischaemum rugosum* *Digitaria sanguinalis* *Setaria verticillata* *Eleochloa geniculata* *Cyperus difformis*	Costa 3.0 - 4.0 Jaén Bagua 2.5 - 3.0 2.0 - 2.5	Costa 2.5 - 3.0 Jaén Bagua 2.0 - 2.5 2.0 - 3.0	–	Se recomienda no aplicarlo 60 días antes de la cosecha	Grano 0.05 Paja 0.02
Cebolla	Yuyo hembra Verdolaga	*Amaranthus gracilis* *Portulaca oleracea*	2.0 - 2.5 2.0 - 3.0	2.0 - 3.0	–		
Algodón	Bejucillo Clavo de agua	*Ectipta alba* *Jussiaea linifolia*	2.0 - 3.0	–	–		
Pimiento	Verdolaga Pata de gallina	*Portulaca oleracea* *Eleusine indica*	–	2.0	–		0.05
Vid	Verdolaga Pata de gallina	*Portulaca oleracea* *Eleusine indica*	–	–	1.75 - 2.0	60	0.05
Espárrago	Verdolaga Pata de gallina Yuyo Hierba de gallinazo	*Portulaca oleracea* *Eleusine indica* *Amaranthus hybridus* *Chenopodium murale*	–	–	1	7	0.05

*PC = Periodo de carencia (días) **LMR = Límite Máximo de Residuos (ppm)

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION: RONSTAR 25 EC es un herbicida pre-emergente que debe ubicarse uniformemente en el suelo para una acción eficiente, requiere una buena preparación de éste para que la superficie esté mullida y no haya terrones al momento de la aplicación.

a) **ARROZ DE TRANSPLANTE:** Aplique **RONSTAR 25 EC** a la dosis recomendada de 2 días a 8 días después de realizado el transplante, manteniendo el suelo drenado (sin agua), pero húmedo, (al estado barro) El agua de las pozas debe ser repuesta 48 horas después de la aplicación y luego se seguirá el manejo normal del riego.

b) **ARROZ DE SIEMBRA DIRECTA:** En siembras mecánicas o al "voleo" use **RONSTAR 25 EC** a la dosis recomendada sobre el suelo preparado y humedo (barro) 2 días a 8 días después del primer riego de germinación, osea un poco antes de la emergencia del arroz y de las malezas: no aplique con más del 20% del arroz emergido o "puyado".
En estos sistemas de siembra, es muy importante mantener la humedad del suelo después de la aplicación, ya que ésta es esencial para una buena acción del producto, evítese resecamiento del campo que agrete el suelo, ya que ello hace posible la emergencia de malezas que se encuentran, por debajo de la capa protectora de **RONSTAR 25 EC.**

c) **CEBOLLA DE SIEMBRA DIRECTA:** Aplíquese **RONSTAR 25 EC** a la dosis recomendada desde que la cebolla ha desarrollado 1 hoja y ésta esté completamente erecta (después del estado de "corcheta") en adelante; sobre un suelo humedo.

d) **CEBOLLA DE TRANSPLANTE:** Aplíquese **RONSTAR 25 EC** a la dosis recomendada inmediatamente después del transplante; sobre suelo humedo, con el riego que se da después del transplante.

E) **ALGODÓN:** En algodón de siembra, en terreno seco con riego de germinación, se puede aplicar **RONSTAR 25 EC** a la dosis recomendada en pre-emergencia neta del cultivo y las malezas sobre un suelo humedo dado con el riego de germinación; después maneja normalmente su cultivo.

PERIODO DE REENTRADA: 24 horas.

INCOMPATIBILIDAD: Se puede aplicar en mezcla con los principales plaguicidas.

FITOTOXICIDAD: Tiene buena fitocompatibilidad con los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y manejo de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas"

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

20 Mayo 2004 - Arte Final Etiqueta 3 cuerpos - Tamaño: 28.5 x 16 cm - Tintas (7): CMYK, Pantone Yellow C, Pantone 340 C y Pantone 376 C