

Medida bolsa trilaminada: 22 cm x 16 cm
Medida del area de impresión: 18 cm x 13.5 cm
Actualizada: Set. 2015
ML

TIRA

PANTONE 293 C

Azostar®
50 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA AGRÍCOLA
GRÁNULO DISPERSABLE - WG

Composición:

Azoxystrobin500 g/kg
Aditivos500 g/kg

Reg. PQUA N° 479 - SENASA

Titular del registro:
MONTANA S.A.

Formulado por:
SHANDONG A&FINE
AGROCHEMICALS CO., LTD.
Shandong Shouguang Economy
Technology Development Zone, China
Teléfono: 0086 536 5100106

Importado y Distribuido por:
MONTANA S.A.

Av. Javier Prado Este N° 6210,
Oficina 401, La Molina. Lima - Perú.
Teléfono: (511) 419-3000
E-mail: info@corpmontana.com

Contenido Neto: 100 g

Lote N°:

Fecha de Form.

Fecha de Exp.:

50
MONTANA años

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

Medida bolsa trilaminada: 22 cm x 16 cm
Medida del área de impresión: 18 cm x 13.5 cm
Actualizada: Ene. 2015
ML

RETIRA

PANTONE 293 C

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es ligeramente tóxico, por lo que deberá evitar su ingestión, inhalación, contacto cutáneo y ocular.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar el producto en lugares frescos y bien ventilados.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AZOSTAR® 50 WG es un fungicida de amplio espectro para el control de diversas enfermedades. Presenta una acción sistémica en forma ascendente y movimiento translaminar. Está compuesto por azoxystrobin el cual inhibe la respiración del hongo a nivel mitocondrial interrumpiendo de esta manera la producción de energía. Sobre los hongos, **AZOSTAR® 50 WG** inhibe la germinación de las esporas, el desarrollo del tubo germinativo y el crecimiento inicial del micelio del hongo. Además presenta un fuerte efecto antiesporulante. **AZOSTAR® 50 WG** favorece una mejor asimilación de nitrógeno en la planta aumentando la capacidad fotosintética y retardando la senescencia del cultivo, esto da como resultado un mejor rendimiento al momento de cosecha.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
ESSALUD: 117
CICOTOX: 0-800-1-3040

CUADRO DE USOS

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVOS	ENFERMEDAD		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	Kg/ha	g/200L		
Pimiento, páprika y ají	Oídiosis	<i>Leveillula taurica</i>	0.20 - 0.24	80	3	2
Vid	Oídiosis	<i>Erysiphe necator</i>	0.2	40	14	2
Cebolla	Mancha púrpura	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.25 - 0.30	100	2	10
Alcachofa	Oídiosis	<i>Leveillula taurica</i>	0.20 - 0.24	80	7	5
Espárrago	Mancha púrpura	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.20 - 0.25	80 a 100	N.D.	0.05
Mandarina	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.40 - 0.50	40 a 50	0	15

PC: Período de carencia / LMR: Límite Máximo de Residuos



AZOSTAR - TIRA 9.8cm X 18cm

LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS


Azostar®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA
GRANULO DISPERSABLE -WG

MONTANA

- Grupo químico: Estrobilurina
- Registro: PQUA N°479-SENASA
- Nombre común: Azoxystrobin 500 g/kg
- Nombre químico: Methyl 4-(2,12,16-tricyanophenoxypyrimidin-4-yl)phenyl-3-methoxyacrylate
- Fórmula empírica: C₂₁H₁₁N₃O₃
- Peso molecular: 403.39 g/mol
- Fórmula estructural:



- Propiedades físicas y químicas:
 - Aspecto: Sólido en gránulos
 - Color: Marrón claro
 - pH: 5 - 8 en solución al 1% w/v
 - Punto de fusión: No disponible
 - Punto de ignición: No disponible
 - Propiedades oxidantes: No oxidable
 - Inflamabilidad: No inflamable

- Capacidad y clase de los envases: 100 g
- Titular del registro: MONTANA S.A.
- Formulado por: SHANDONG AFININE AGROCHEMICALS CO. LTD. Shandong Shouguang Economy Technology Development Zone, China.
- Distribuidor: MONTANA S.A. Av. Javier Prado Este N° 6210 (Edificio 401), La Molina, Lima - Perú.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es ligeramente tóxico, por lo que deberá evitar su ingestión, inhalación, contacto cutáneo y ocular.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar el producto en lugares frescos y bien ventilados.
- Después de usar el producto, lávese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, llevar a la persona a un lugar con aire fresco. Si no respira brindarle respiración artificial.
- En caso de ingestión, solicitar atención médica inmediata. Si la persona puede beber, darle uno o dos vasos de agua. No dar de beber nada a la persona si se encuentra inconsciente.
- Nota al médico: No se conoce antídoto específico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

ESALUD: 117
CICOTOX: 0-800-1-3040

AZOSTAR - RETIRA 9.8cm X 18cm

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido de la bolsa destina este envase y deposítalo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua potable.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con restos de aplicación o sobrantes de producto.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- No aplicar el producto en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AZOSTAR® 50 WG es un fungicida de amplio espectro para el control de diversas enfermedades. Presenta una acción sistémica en forma ascendente y movimiento transláminar. Esta compuesto por azoxystrobin el cual inhibe la respiración del hongo a nivel mitocondrial interrumpiendo de esta manera la producción de energía. Sobre los hongos, **AZOSTAR® 50 WG** inhibe la germinación de las esporas, el desarrollo del tubo germinativo y el crecimiento inicial del micelio del hongo. Además presenta un fuerte efecto antisporulante. **AZOSTAR® 50 WG** favorece una mejor asimilación de nitrógeno en la planta aumentando la capacidad fotosintética y retardando la senescencia del cultivo, esto da como resultado un mejor rendimiento al momento de cosecha.

Preparación de la Mezcla:

AZOSTAR® 50 WG se aplica en mezcla con agua. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o ¼ partes de su capacidad, hacer una promezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o recipiente aparte, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, verter la mezcla al tanque de aplicación y completar el volumen de agua a utilizar. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

AZOSTAR® 50 WG puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (mochilas), motopulverizadores, equipos estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS

CULTIVOS	ENFERMEDAD			DOSIS		FC (litro/ha)
	Nombre Común	Nombre Científico	Agro	g/200L	litro/ha	
Frutales, plantas y arb.	Chilechil	Conchali	0.25 - 0.28	80	3	2
	Quilón	Epilobium	0.2	40	14	2
Cereales	Mancha blanca	Stenophoma	0.25 - 0.30	100	2	10
Alfalfa	Chilechil	Conchali	0.20 - 0.24	80	7	3
Espartero	Mancha blanca	Stenophoma	0.25 - 0.25	80 a 100	N/D.	0.85
Montano	Mancha blanca	Stenophoma	0.40 - 0.50	40 - 50	0	15

PC: Período de Carenta
LMR: Límite Máximo de Residuo

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar en forma preventiva o al observar los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo del hongo.
- Se recomienda como máximo realizar tres (3) aplicaciones de **AZOSTAR® 50 WG** por campaña. Para ello puede aplicar **AZOSTAR® 50 WG** dos veces de manera consecutiva para luego rotar con otro fungicida de diferente grupo químico.

PERÍODO DE REINGRESO

Reingrese al área tratada después de 24 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

AZOSTAR® 50 WG es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común e incompatible con los plaguicidas de reacción alcalina. Se recomienda antes de efectuar la mezcla, hacer pruebas de compatibilidad con el producto que se desee mezclar.

FITOTOXICIDAD

AZOSTAR® 50 WG no es fitotóxico usado a la dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendados en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.