

7 cm

13.8 cm

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido de la bolsa destruya este envase y deposítelo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua potable.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con restos de aplicación o sobrantes de producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AZOSTAR® 50 WG es un fungicida de amplio espectro para el control de diversas enfermedades. Presenta una acción sistémica en forma ascendente y movimiento translaminar. Está compuesto por azoxystrobin el cual inhibe la respiración del hongo a nivel mitocondrial interrumpiendo de esta manera la producción de energía. Sobre los hongos, **AZOSTAR® 50 WG** inhibe la germinación de las esporas, el desarrollo del tubo germinativo y el crecimiento inicial del micelio del hongo. Además presenta un fuerte efecto antiesporulante. **AZOSTAR® 50WG** favorece una mejor asimilación de nitrógeno en la planta aumentando la capacidad fotosintética y retardando la senescencia del cultivo, esto da como resultado un mejor rendimiento al momento de cosecha.

Preparación de la Mezcla:

AZOSTAR® 50 WG se aplica en mezcla con agua. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o ¾ partes de su capacidad, hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o recipiente aparte, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

AZOSTAR® 50 WG puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (mochila), motopulverizadores, equipos estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados.

RETIRA 41.4 cm X 7cm

13.8 cm

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS

CULTIVOS	ENFERMEDAD		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	Kg/ha	g/200L		
Pimiento, p��prika y aj��	Oidiosis	<i>Leveillula taurica</i>	0.20 - 0.24	80	3	2
Vid	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	0.2	40	14	2
Cebolla	Mancha p��rpura	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.25 - 0.30	100	2	10
Alcachofa	Oidiosis	<i>Leveillula taurica</i>	0.20 - 0.24	80	7	5
Esp��rrago	Mancha p��rpura	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.20 - 0.25	80 - 100	N.D.	0.05
Mandarina	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.40 - 0.50	40 - 50	0	15
Ar��ndano	Cabeza de clavo	<i>Alternaria tenuissima</i>	0.30		4	5

PC: Per  odo de carencia

LMR: L  mite M  ximo de Residuos

13.8 cm

FRECUENCIA Y   POCA DE APLICACI  N

-Aplicar en forma preventiva o al observar los primeros s  ntomas de la enfermedad o cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo del hongo.

-Se recomienda como m  ximo realizar tres (3) aplicaciones de **AZOSTAR® 50 WG** por campa  a. Para ello puede aplicar **AZOSTAR® 50 WG** dos veces de manera consecutiva para luego rotar con otro fungicida de diferente grupo qu  mico.

-En ar  ndano, se recomiendan 2 aplicaciones por campa  a, con un intervalo entre aplicaciones de 21 d  as, y una campa  a al a  o.

PERIODO DE REINGRESO

Reingrese al   rea tratada despu  s de 24 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

AZOSTAR® 50 WG es compatible con la mayor  a de plaguicidas de uso com  n e incompatible con los plaguicidas de reacci  n alcalina. Se recomiendan antes de efectuar la mezcla, hacer pruebas de compatibilidad con el producto que se desee mezclar.

FITOTOXICIDAD

AZOSTAR® 50 WG no es fitot  xico usado a la dosis, sistemas de aplicaci  n y cultivos recomendados en la presente etiqueta. **RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las caracter  sticas fisicoqu  micas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aqu   recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

