Medidas: 24x 18CM
JUNIO 2020

RETIRA

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
-Este producto es ligeramente tóxico, por lo que deberá evitar su ingestión, inhalación, contacto cutáneo y ocular.
-No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
-Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
-No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
-Almacenar el producto en lugares frescos y bien ventilados.
-Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
-Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
-Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS
-Grupo Químico : Estrobilurina
-En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
-En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
-En caso de inhalación, llevar a la persona a un lugar con aire fresco. Si no respira brindarle respiración artificial.
-En caso de ingestión, solicitar atención médica inmediata. Si la persona puede beber, darle uno o dos vasos de agua. No dar de beber nada a la persona si se encuentra inconsciente.
-Nota al médico: No se conoce antídoto específico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
ESSALUD: 117
CICOTOX: 0-800-1-3040

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
-Después de usar el contenido de la bolsa destruya este envase y depósitelo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.
-Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua potable.
MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
- Peligroso para organismos acuáticos.
-No contaminar lagos, rios, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
-No contaminar las fuentes de agua con restos de aplicación o sobrantes de producto.
-Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
-Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

• No aplicar el producto en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
• En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
AZOSTAR® 50 WG es un fungicida de amplio espectro para el control de diversas enfermedades. Presenta una acción sistémica en forma ascendente y movimiento translaminar. Está compuesto por azoxystrobin el cual inhibe la respiración del hongo a nivel mitocondrial interrumpiendo de esta manera la producción de energía. Sobre los hongos, **AZOSTAR® 50 WG** inhibe la germinación de las esporas, el desarrollo del tubo germinativo y el crecimiento inicial del micelio del hongo. Además presenta un fuerte efecto antiesporulante. **AZOSTAR® 50 WG** favorece una mejor asimilación de nitrógeno en la planta aumentando la capacidad fotosintética y retardando la senescencia del cultivo, esto da como resultado un mejor rendimiento al momento de cosecha.
Preparación de la Mezcla:
AZOSTAR® 50 WG se aplica en mezcla con agua. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o ¾ partes de su capacidad, hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o recipiente aparte, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.
AZOSTAR® 50 WG puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (mochila), motopulverizadores, equipos estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados.
FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
- Aplicar al observar los primeros síntomas o cuando las condiciones sean las apropiadas para el desarrollo de la enfermedad.
- Se recomienda máximo tres (3) aplicaciones de **AZOSTAR® 50 WG** por campaña.
-En arándano, se recomiendan 2 aplicaciones por campaña, con un intervalo entre aplicaciones de 21 días, y una campaña al año.
PERIODO DE REINGRESO
Reingrese al área tratada después de 24 horas de aplicado el producto.
COMPATIBILIDAD
AZOSTAR® 50 WG es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común e incompatible con los plaguicidas de reacción alcalina. Se recomienda antes de efectuar la mezcla, hacer pruebas de compatibilidad con el producto que se desee mezclar.
FITOTOXICIDAD
AZOSTAR® 50 WG no es fitotóxico usado a la dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendados en la presente etiqueta.
RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

CULTIVOS	ENFERMEDAD		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	Kg/ha	g/200L		
Pimiento, páprika y ají	Oidiosis	*Leveillula taurica*	0.20 - 0.24	80	3	2
Vid	Oidiosis	*Erysiphe necator*	0.2	40	14	2
Cebolla	Mancha púrpura	*Stemphylium vesicarium*	0.25 - 0.30	100	2	10
Alcachofa	Oidiosis	*Leveillula taurica*	0.20 - 0.24	80	7	5
Espárrago	Mancha púrpura	*Stemphylium vesicarium*	0.20 - 0.25	80 - 100	N.D.	0.05
Mandarina	Moho gris	*Botrytis cinerea*	0.40 - 0.50	40 - 50	0	15
Arándano	Cabeza de clavo	*Alternaria tenuissima*	0.30		4	5

PC: Periodo de carencia
LMR: Límite Máximo de Residuos