

Azostar®

50 WG

GRANULO DISPERSABLE - WG

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Composición Química:

Azoxystrobin500 g/kg
Aditivos500 g/kg

Reg. PQUA N° 479 – SENASA

Titular del registro:
Montana S.A.

Formulado por:
SHANDONG A&FINE
AGROCHEMICALS CO., LTD.
Shandong Shouguang Economy
Technology Development Zone, P.R China
Teléfono: 0086 536 5100106

Contenido neto: 1 kg

Fecha de Fab.:
Fecha de Exp.:
Lote N°:

MONTANA S.A.

Importado y distribuido por:
Montana S.A.
Av. Los Rosales 280,
Santa Anita, Lima, Perú
Teléfono: (511) 4193000
E-mail: info@montana.com.pe

NO INFLAMBLE **NO EXPLOSIVO** **NO CORROSIVO**

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es ligeramente tóxico, por lo que deberá evitar su ingestión, inhalación, contacto cutáneo y ocular.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar el producto en lugares frescos y bien ventilados.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico : Estrobilurina
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, llevar a la persona a un lugar con aire fresco, sino respira brindarle respiración artificial.
- En caso de ingestión, solicitar atención médica inmediata. Si la persona puede beber, darle uno o dos vasos de agua. No dar de beber nada a la persona si se encuentra inconsciente.
- Nota al médico: No se conoce antídoto específico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

ESSALUD: 117
CICOTOX: 0-800-1-3040
MONTANA: (01) 419-3000

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, cortándolo o perforándolo y deposítelo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua potable

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACION DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

- No contamine las fuentes de agua con restos de aplicación o sobrantes de producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AZOSTAR® 50 WG es un fungicida sistémico, de amplio espectro y acción translaminar. Inhibe la germinación de las esporas y crecimiento del micelio.

Preparación de la Mezcla:

Ponga la mitad de agua en el tanque de aspersión con la dosis del producto recomendada, mantenga agitación constante, complete el resto de agua.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar al observar los primeros síntomas o cuando las condiciones sean las apropiadas para el desarrollo de la enfermedad.
- Se recomienda máximo 3 aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO

Reingrese al área tratada después de 24 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

AZOSTAR® 50 WG es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de reacción alcalina. Al realizar la mezcla es recomendable efectuar una confirmación previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

AZOSTAR® 50 WG no es fitotóxico usado a la dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendados en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”
CUADRO DE USOS

| CULTIVOS | ENFERMEDAD | | DOSIS g/200L | PC (días) | LMR (ppm) |
|----------------------------|--------------|---------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| | Nombre Común | Nombre Científico | | | |
| Pimiento, páprika y ají | Oidium | <i>Leveillula taurica</i> | 80 | 3 | 2.0 |

PC: Período de carencia
LMR: Límite Máximo de Residuos

