

Curzate® M8

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable (WP)

Composición Química:

Cymoxanil.....	80 g/kg
Mancozeb.....	640 g/kg
Aditivos.....	1 kilo
	C.S.P.

Reg. Producto No. 728-98-AG-SENASA

Titular del Registro: **DuPont Perú S.A.C.**
Av. República de Panamá 3531,
Of. 1203 - Lima 27
Lima-Perú

Formulado por:

DuPont de Colombia S. A.
Calle 113 No.7-21, Torre A, Piso 14
Teléfono:629 2202 Fax.:629 2428/29
Bogotá D.C.- Colombia



Importado y distribuido por:



Calle Dean Valdivia 148 Piso 7
San Isidro, Lima 27- PERU
Teléfono: (01) 630-6400 Fax: (01) 630-6410
www.farmex.com.pe

Contenido Neto: 1 Kilo

No. Lote: Fecha de Formulación: Fecha de Vencimiento:

NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO NO CORROSIVO

© Marca Registrada de E.I. du Pont de Nemours and Company
A01548285

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación (use guantes, botas, overol de dos piezas, gafas de protección y respirador), y para ingresar al área tratada.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos y agua para consumo.
- Evite aspirar la neblina de aspersión.
- Evite el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
- Cuidado este producto puede ser dañino si se ingiere.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No re-ensavar o depositar el contenido en otros envases.
- Manténgase alejado del fuego y las chispas.
- No almacene en casa de habitación.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestre copia de esta etiqueta. **En caso de contacto con los ojos,** lívelos inmediatamente con abundante agua durante mínimo 15 minutos. Consulte a un médico. **En caso de contacto con la piel,** lávese inmediatamente la parte afectada con abundante agua. Consulte a un médico. **En caso de ingestión,** inmediatamente llame a un médico o comuníquese con los teléfonos de emergencia para recibir asistencia. Suministre al paciente un vaso con agua si puede beberlo. No induzca el vómito a menos que sea indicado por un médico o por el Centro de Atención Toxicológica. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente. **ANTIDOTO:** No existe un antídoto específico. Su tratamiento es sintomático.

Grupo Químico:

Cymoxanil: Cianoacetamida.
Mancozeb: Etilenbisditiocarbamato.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: CISPROQUIM 0800-50847
Central de Urgencias y Emergencias de EsSalud 117

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS: Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

ADVERTENCIA: “NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO” EN CASO DE DERRAME RECOGER EL PRODUCTO Y DEPOSITARLO EN EL SITIO DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE: “Este producto es tóxico para los peces. “No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. “No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos. “No aplicar cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo. “No aplique cuando las condiciones ambientales favorezcan el arrastre de la aspersión desde las áreas tratadas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Curzate® M8 es fungicida de acción preventiva y curativa por ser sistémico, lo cual mejora su acción de control en periodos de mayor presión de la enfermedad.

Curzate® M8 se aplica a las plantas en aspersión foliar preventivamente o con los primeros síntomas de la enfermedad.

Preparación de la mezcla:

Disuelva completamente la cantidad de **Curzate® M8** en un balde y luego deposítelo en el tanque de mezcla que contenga agua hasta 3/4 ó la mitad, complete el volumen de agua y agite hasta que la mezcla sea homogénea. Agite la mezcla cada vez que vaya a llenar el equipo.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Dependiendo de las condiciones del clima y del ambiente que favorezcan la enfermedad, las aplicaciones pueden iniciarse temprano en el ciclo de cultivo y terminarse en la etapa reproductiva cuando los frutos alcanzan su madurez fisiológica.

Similarmente, los periodos entre una aplicación y la siguiente pueden ser de 7 a 14 días. No realizar más de 3 aplicaciones, rotando con otros productos de diferente mecanismo de acción.

PERÍODO DE REINGRESO:

Ingrese al área tratada después de 24 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Curzate® M8 es compatible con los plaguicidas que son compatibles con Mancozeb. Si el producto compañero de la mezcla aumenta el pH del agua por encima de 8.5, entonces la tracción correspondiente al Cymoxanil sufre degradación.

En el caso de que se desconozca la compatibilidad hay necesidad de hacer una prueba previa a su uso. Los siguientes productos son físicamente compatibles con **Curzate® M8: Benomil, Metomil y Oxamil.**

FITOTOXICIDAD:

Curzate® M8 ha mostrado seguridad en los cultivos y dosis registrados, no causando sintoma de fitotoxicidad, ni reducción en los rendimientos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.”

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS:

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PERÍODO DE CARENIA (DÍAS) *	LÍMITE MÁXIMO DE RESIDUOS (PPM)	
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	kg/ha	g/cil 200 litros		CYMOXANIL	MANCOZEB
Papa	Rancha o Hielo fungoso o Seca seca	<i>Phytophthora infestans</i>	2 ± 3	500	14	0.05 ⁽¹⁾	0.2 ⁽¹⁾
Tomate	Rancha o Hielo fungoso	<i>Phytophthora infestans</i>	2 ± 3	500	7	0.2 ⁽¹⁾	4 ⁽¹⁾
Cebolla	Mildiu	<i>Pseudonospora destructor</i>	2 ± 3	500	14	N.D.	0.5 ^(1,2)
Zapallo	Mildiu	<i>Pseudonospora cubensis</i>	2 ± 3	500	7	0.05 ⁽¹⁾	0.5 ⁽¹⁾

N.D. No Definido. (1) TOLERANCIA EN ppm (Valores obtenidos de EPA-Estados Unidos.). (2) CODEX. (*) PERÍODO DE CARENIA: Intervalo entre la última aplicación y la cosecha (días).



FICHA TÉCNICA

Presentación	Curzate LBL 1 kilo	Razón del cambio
País	Perú	Actualización Dirección DuPont Colombia
Tamaño	25 x 34 cm	
Colores	Azul Pantone 293 C Rojo Pantone 186 C Verde Pantone 343 C Negro 100%	
Código vigente	A01548285	
A obsoleto	A01492129	Fecha de Revisión: 14/08/2013