

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Moderadamente peligroso por inhalación. Puede ser letal si es inhalado.
- Altamente irritante a las vías respiratorias.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Ligeramente irritante a la piel.
- Tóxico por ingestión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Después de usar este producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- Conservar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto en lugares frescos y bien ventilados.
- No reutilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.
- Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- **Cinco-químico:** Clorotriol.
- En caso de intoxicación por ingestión, llevar inmediatamente al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de intoxicación por inhalación, trasladar al paciente a un lugar ventilado. Aplicar respiración artificial u oxígeno en caso necesario y llevar inmediatamente al médico.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos y consultar al médico.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- Nota al médico: tratamiento sintomático y de soporte.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilice triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX : 8 800 1 3840
SILVESTRE: (01) 617- 3300

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas u otros artrópodos beneficiosos.
- Tóxico para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

Zetron[®]
720 SC

FUNGICIDA AGRÍCOLA
Suspensión Concentrada (SC)

Composición Química: Chlorothalonil 720 g/L
Aditivos c.s.p. 1L

Registro PQUA N° 272 - SENASA

Contenido Neto: **500 ml**
N° Lote
F. de Form.
F. de Venc.



Titular de Registro: SILVESTRE PERÚ S.A.C.
Calle Arica 242, Miraflores, Lima 18 - Perú.
Tel.: (01) 617-3300 Fax: (01) 617-3312
Correo electrónico: sec@grupossilvestre.com.pe

Formulado por: NOVA CROP PROTECTION CO. LTD.
8 South Liyuan Road, Jiangning Dis.
Nanjing 211100 CHINA
Teléfono: +86-25-52782915

Importado, envasado y distribuido por: SILVESTRE PERÚ S.A.C.

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

NO INFLAMABLE



MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO / GENERALIDADES

ZETRON[®] 720 SC, es un fungicida no sistémico, de amplio espectro y con acción preventiva. Posee una capacidad de traslocación local que le confiere acción erradicante sobre numerosas enfermedades de origen fúngico. También posee un efecto cicatrizante de las lesiones producidas por patógenos sensibles, observándose una recuperación más rápida en los tejidos dañados.

ZETRON[®] 720 SC, inhibe la respiración de las células del hongo. Los efectos del producto sobre las células fúngicas son la disminución del crecimiento del micelio y la inhibición de la germinación de las conidias.

ZETRON[®] 720 SC, se aplica en aspersión, previa mezcla con agua, mediante pulverizadoras mecánicas, atomizadoras o equipos accionados a tractor.

ZETRON[®] 720 SC, se emplea diluido en agua. Preparar una pre-mezcla de acuerdo a la dosificación indicada en la mitad de volumen de agua a utilizar, agitar y completar el volumen de aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos

CULTIVO	E N F E R M E D A D		DOSIS	P. C. (Días)	LMR (ppm)	
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO				
ESPARRAGO	"Cercosporiosis"	Cercospora asparagi	1.5	500	14	0.1
CEBOLLA	"Alternariosis"	Alternaria porri	-	400	14	0.5

LMR: Límite Máximo Residuo
P. C.: Período de Carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

No aplicar en época de floración.
Realizar aplicaciones preventivas, procurando una buena cobertura del follaje.
Repetir las aplicaciones cada 15 días. Máximo 3 aplicaciones por campaña y dos campañas por año.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo sin equipo de protección, 48 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

Se puede emplear en mezcla con los plaguicidas agrícolas más comunes, excepto los de reacción alcalina y caldo Bordales. Se puede aplicar en mezcla con fertilizantes foliares y adherentes más comunes. Al realizar la mezcla, es recomendable efectuar una prueba de compatibilidad previa.

FITOTOXICIDAD

No se ha observado síntomas de fitotoxicidad, debido a las bajas concentraciones empleadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las propiedades fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

