UIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
ANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

ONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
nar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
le usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y

ipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación, y para ingresar al área
as primeras 24 horas.
aplicación siguiendo la dirección del viento.
el producto en lugares frescos y bien ventilados.
o es nocivo por ingestión y por contacto con la piel.
o es peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo, vapor o aspersión.

AUXILIOS
mico: Piretroide.
e intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle

afectado de la zona de exposición, remover la ropa contaminada y disponerla en lugar

e contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua y si el contacto fuese con la piel,
abundante agua y jabón.
e inhalación, trasladar al afectado al aire fresco. Proporcionar respiración artificial en
necesario.
vómitos ni dar nada por la boca a una persona que se encuentra en estado
e.
dico: Tratamiento sintomático. En caso de intoxicación severa, la terapia debe incluir
anticonvulsivos.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
ESSALUD: 117
CICOTOX: 0-800-1-3040

DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
le usar el contenido, enjuague tres veces y vierta la solución en la mezcla de
luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y depósitelos en el lugar destinado
ridades locales para este fin.
al envase triple lavado al centro de acopio.
bligatoriamente el triple lavado del presente envase.

PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
para las abejas u otros artrópodos benéficos. Evitar la aplicación en época de floración.
para organismos acuáticos y semiacuáticos.
inar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
inar las fuentes de agua con restos de aplicación o sobrantes del producto.
una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área

or debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

Cypmor 25 EC

Plaguicida Químico de Uso Agrícola

INSECTICIDA AGRICOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

Composición:

Cipermetrina ..... 250 g/L
Aditivos ..... csp 1 L

Reg.N° 946-2000-AG-SENASA

Fabricado y Formulado por:
Agrimor IL. LTD - China
23 FL, RIHAO BLDG, BAOAN
SOUTH RD,
Tel: 0086-755-82480398

Titular del Registro:
JEBSEN & JESSEN PERU SAC
AV. DE LA FLORESTA N° 497
SAN BORJA - LIMA - PERU

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
Solandina Perú SAC.
Tel.: +51960241693
Av. Alfredo Benavides N° 2975 - Of. 902
Urb. A. Von Humboldt - MIRAFLORES
LIMA - PERÚ

Solandina

Lote N°
Fecha de Formulación:
Fecha de Expiración:
Contenido Neto: 1 L.

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
Cypmor 25 EC, es un insecticida piretroide que actúa por contacto e ingestión. No es tiene un amplio espectro de acción, controla diversas especies de insectos, picadores chupadores y matadores.

FORMA DE APLICACIÓN
El producto puede aplicarse con bombas de mochila a palanca o motorizado o con equipos motorizados de alta capacidad, así como en aplicaciones aéreas. En todo caso debe haber buena cobertura de aplicación.
El volumen de agua recomendado para equipos de aplicación terrestres, fluctúa entre 400 a 800 litros por Ha, dependiendo de la densidad y desarrollo vegetativo del cultivo.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	NOMBRE COMÚN	NOMBRE TÉCNICO	DOSIS ml/cil 200L	P.C. días	L.M.R. ppm
Algodón	Arrebiatado	*Dysdercus peruvianus*	200	14	0.05
	Gusano rosado	*Pectinophora gossypiella*	200		
Papa	Mosca Minadora	*Liriomyza huidobrensis*	200	14	0.05
Frijol	Barrenador de brotes	*Crocidosema aporema*	150	14	0.2
Cebolla	Thrips	*Thrips tabaci*	150	14	0.05
Maiz	Gusano cogollero	*Spodoptera frugiperda*	200	14	0.1

P.C.: Período de carencia en días.
L.M.R.: Limite máximo de residuos en p.p.m.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Según la plaga en el cultivo y las recomendaciones del Ingeniero Agrónomo.

PERÍODO DE REINGRESO
No ingrese al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD
NO ES FITOTOXICO A LAS DOSIS RECOMENDADAS

COMPATIBILIDAD
Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso agrícola, excepto con aquellos de marcada reacción alcalina.

RESPONSABILIDAD CIVIL: STOCKTON PERÚ SAC garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.