

49.0 cm

23.0 cm

10.7 cm

3.0 cm

10.8 cm

1.5 cm

2.5 cm

30.0 cm

35.0 cm

2.5 cm

1.8 x 1.0

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la mezcla o el producto.
- Retirar los envases del producto.
- Evitar la contaminación por aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este tipo de residuos.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PROPSIL® 700 PM es un fungicida de contacto y preventivo para controlar enfermedades fúngicas en cultivos agrícolas. PROPSIL® 700 PM se emplea en agua para preparar una premezcla, distribuyendo la cantidad necesaria de PROPSIL® 700 PM en un balde, luego vaciar al recipiente del cultivo completándole la cantidad de agua requerida. Aplicar en pulverizaciones al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochila a espalda, atomizadora, etc.).

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Iniciar las aplicaciones preventivamente cuando las condiciones ambientales sean favorables para la presencia de la enfermedad. Se recomienda máximo una aplicación por campaña, considerando dos campañas al año.

PERIODO DE REINGRESO

Reingresar al área tratada después de 24 horas de aplicación al producto.

COMPATIBILIDAD

PROPSIL® 700 PM es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando con los de acción alcalina, sin embargo se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

PROPSIL® 700 PM no es fitotóxico para los cultivos recomendados, si se sigue las recomendaciones dadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del Registro garantiza que las características físico-químicas, toxicológicas y de seguridad de PROPSIL® 700 PM están anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines a que es recomendado, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

INGENIERO AGRÓNOMO"

DOSIS	Kg/ha	PC (dl/ha)	LMR (ppm)
0.5	-	10	1.0
0.5	-	14	0.5
0.5	2.0	30	0.05
0.5	-	14	0.05
0.5	-	14	0.05
0.5	-	7	0.30
0.5	-	3	1
0.5	2.0	51	0.2

PC: Porcentaje de cobertura



Propisil®

700 PM

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable (WP)

Composición Química:

Propineb 700 g/kg
Aditivos c.s.p 1 kg

Registro PQUA N° 489 - SENASA

Titular de Registro: SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Calle Arica 242 Miraflores, Lima 18 - Perú.
Tel.: (01) 617-3300 Fax: (01) 617-3312

Correo electrónico: sec@silvestre.com.pe

Formulado por:

PARIJAT INDUSTRIES (INDIA) PVT. LTD.
Changfenghe Road, Nanjing, Chemical Industrial
Park Luhe District, Nanjing, P.R. China.
Tel.: +91-11-41638091 Fax: +91-11-41638097

Importado y

Distribuido por: SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Contenido Neto: 1 Kg

F. de Form.:
N° Lote:
F. de Venc.:



NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es ligeramente peligroso. No ingerir.
- Conservar el producto en su envase original, seco y ventilado.
- Almacénar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilizar el equipo de protección durante el mezclado y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Ditiocarbamatos
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX: 0-800-1-3040 ó 328 7398
ESSALUD: 0801-10200 ó 411 8000 (opción 4)
CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

"CONSULTE CON UN Cuadro de usos:

CULTIVO	NOMBRE COMÚN	PLAGA
ARVEJA	"Purción gris"	"Borytis ocrea"
CEBOLLA	"Punta seca"	"Stemphylium vesicatum"
ESPÁRRAGO	"Mancha foliar"	"Stemphylium vesicatum"
MANDARINA	"Moho gris"	"Borytis ocrea"
MANZANO	"Purción de las flores"	"Borytis ocrea"
PAPA	"Rancho"	"Phytophthora infestans"
PIÑONTO	"Purción gris"	"Borytis ocrea"
VITIS	"Mildu"	"Plasmopara viticola"

LMR: Límite Máximo de Residuos



0007

Propisil[®]
700 PM

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable (WP)

Composición Química:

Propineb	700 g/kg
Aditivos	c.s.p 1 kg

Registro PQUA N° 489 - SENASA

Titular de Registro: SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.
Tel.: (01) 617-3300 Fax: (01) 617-3312
Correo electrónico: sec@silvestre.com.pe

Formulado por:

PARIJAT INDUSTRIES (INDIA) PVT. LTD.
Changfenghe Road, Nanjing, Chemical Industrial
Park Luhe District, Nanjing, P.R. China.
Tel.: +91-11-41638091 Fax.: +91-11-41638097

Importado y

Distribuido por: SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Silvestre
Protección Vegetal

Contenido Neto: 25 Kg

F. de Form.:

Nº Lote:

F. de Venc.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"¡MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS!"

- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia fuentes de agua de al menos 3 metros.
- No aplicar el producto en zonas domesticas, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios designados por las autoridades locales para esto fin.
- No utilizar el producto en otros medios de transporte.
- Para controlar la deriva.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PROPSIL® 700 PM es un fungicida de contacto y preventivo para el control de enfermedades fungosas.

PROPSIL® 700 PM se emplea diluido en agua, preparar una emulsión, distribuyendo la cantidad necesaria de **PROPSIL® 700 PM** en un balde, luego vaciar al recipiente definitivo completando la cantidad de agua requerida.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

iniciar las aplicaciones preventivamente cuando las condiciones ambientales sean favorables para la presencia de la enfermedad. Se recomienda máximo una aplicación por campaña, considerando dos campañas al año.

PERIODO DE REINGRESO

PERIODO DE REINGRESO
Reingresar al área tratada después de 24 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

COMPATIBILIDAD
PROPSIL® 700 PM es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando con los de reacción alcalina, sin embargo se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

PROPISIL® 700 PM no es fitotóxico para los cultivos recomendados, si se sigue las recomendaciones dadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cuadro de usos:

CULTIVO	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	DOSIS		PC (g/l)	LMR (ppm)
			Kg/200 L	Kg/ha		
ARVEJA	"Pudrición gris"	" <i>Botrytis cinerea</i> "	0.5	-	1.0	1.0
CEBOLLA	"Punta seca"	" <i>Stemphylium vesicarium</i> "	0.5	-	14	0.5
ESPARRAGO	"Mancha foliar"	" <i>Stemphylium vesicarium</i> "	0.5	2.0	30	0.05
MANDARINA	"Mofo gris"	" <i>Botrytis cinerea</i> "	0.5	-	14	0.05
MANZANO	"Pudrición de las flores"	" <i>Botrytis cinerea</i> "	0.5	-	14	0.05
PAPA	"Ranchar"	" <i>Phytophthora infestans</i> "	0.5	-	7	0.30
PIÑONERO	"Pudrición gris"	" <i>Botrytis cinerea</i> "	0.5	-	3	1
VID	"Mildiu"	" <i>Plasmogonea viticola</i> "	0.5	2.0	9	0.2

MR	Limite Máximo de Resíduos
1	100
2	200
3	300
4	400
5	500
6	600
7	700
8	800
9	900
10	1000
11	1100
12	1200
13	1300
14	1400
15	1500
16	1600
17	1700
18	1800
19	1900
20	2000
21	2100
22	2200
23	2300
24	2400
25	2500
26	2600
27	2700
28	2800
29	2900
30	3000
31	3100
32	3200
33	3300
34	3400
35	3500
36	3600
37	3700
38	3800
39	3900
40	4000
41	4100
42	4200
43	4300
44	4400
45	4500
46	4600
47	4700
48	4800
49	4900
50	5000
51	5100
52	5200
53	5300
54	5400
55	5500
56	5600
57	5700
58	5800
59	5900
60	6000
61	6100
62	6200
63	6300
64	6400
65	6500
66	6600
67	6700
68	6800
69	6900
70	7000
71	7100
72	7200
73	7300
74	7400
75	7500
76	7600
77	7700
78	7800
79	7900
80	8000
81	8100
82	8200
83	8300
84	8400
85	8500
86	8600
87	8700
88	8800
89	8900
90	9000
91	9100
92	9200
93	9300
94	9400
95	9500
96	9600
97	9700
98	9800
99	9900
100	10000

PC: Período de Carença



For the first time, we have shown that the