

**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE,
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PROPISIL® 700 PM es un fungicida de contacto y preventivo para el control de enfermedades fungosas.

PROPISIL® 700 PM se emplea diluido en agua; preparar una premezcla, distribuyendo la cantidad necesaria de **PROPISIL® 700 PM** en un balde, luego vaciar al recipiente definitivo completando la cantidad de agua requerida.

Aplicar en pulverizaciones al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochila a palanca, atomizadora, etc.).

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Iniciar las aplicaciones preventivamente cuando las condiciones ambientales sean favorables para la presencia de la enfermedad. Se recomienda máximo una aplicación por campaña, considerando dos campañas al año.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

COMPATIBILIDAD

PROPISIL® 700 PM es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con agentes oxidantes, ácidos, cobre y alcalinos. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

PROPISIL® 700 PM no es fitotóxico para los cultivos recomendados, si se sigue las recomendaciones dadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

INGENIERO AGRÓNOMO"

DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
Kg/200 L	Kg/ha		
0.5	-	10	1.0
0.5	-	14	0.5
0.5	2.0	30	0.05
0.5	-	14	0.05
0.5	-	14	0.05
0.5	-	7	0.30
0.5	-	3	1
0.5	2.0	91	0.2

LMR: Límite Máximo de Residuos



Propisil®

700 PM

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable (WP)

Composición Química:

Propineb 700 g/kg
Aditivos c.s.p 1 kg

Registro PQUA Nº 489 - SENASA

Titular de Registro: SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.
Tel.: (01) 617-3300
Correo electrónico: sec@silvestre.com.pe

Formulado por: NOVA CROP PROTECTION CO., LTD.
8 South Lijuan Road, Jiangning Dis.
Nanjing 211100 CHINA.

Importado y Distribuido por: SILVESTRE PERÚ S.A.C.



Contenido Neto: **1 Kg**

F. de Form.:
Nº Lote:
F. de Venc.:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es ligeramente peligroso. No ingerir.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilizar el equipo de protección durante el mezclado y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Ditiocarbamatos.
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: 0-800-1-3040 o 328 7398
ESSALUD: 0801-10200 o 411 8000 (opción 4)
CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

"CONSULTE CON UN

Cuadro de usos:

CULTIVO	PLAGA	
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO
ARVEJA	"Podrición gris"	"Botrytis cinerea"
CEBOLLA	"Punta seca"	"Stemphylium vesicarium"
ESPÁRRAGO	"Mancha foliar"	"Stemphylium vesicarium"
MANDARINA	"Moho gris"	"Botrytis cinerea"
MANZANO	"Podrición de las flores"	"Botrytis cinerea"
PAPA	"Rancha"	"Phytophthora infestans"
PIMIENTO	"Podrición gris"	"Botrytis cinerea"
VID	"Mildú"	"Plasmopara viticola"

PC: Período de Carenencia

