

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Evite respirar las gotas de aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- El producto es nocivo por ingestión, inhalación y contacto con la piel.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento, en horas de baja insolación y viento.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado, cerrado, en un lugar fresco, alejado del calor y bajo llave.
- No almacenar en casa habitación.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Phosphorothiolate.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca, y si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No existe antídoto específico. Siga tratamiento sintomático.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC: 617-6400

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua o zonas no objetivo de al menos 5 metros.
- El aplicador deberá emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El uso del producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.

COVERAGE

400 EC

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN:

Isoprothiolane..... 400 g/L
Aditivosc.s.p. 1L

Reg. PQUA N°
Titular del Registro: NEO AGRUM S.A.C.

Importado y distribuido por:



Av. Grau N° 715 Barranco
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

N° de Lote:
F. de Form.:
F. de Venc.:

Formulado por:
SINOCEM SHANGHAI CO. LTD
17-19 Fl., N° 33 He Nan Road (South), Shanghai
CHINA



NO EXPLOSIVO

INFLAMABLE

NO CORROSIVO

Contenido neto: 1 L

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

COVERAGE 400 EC es un fungicida sistémico de amplio espectro, de acción preventiva y curativa.
COVERAGE 400 EC se absorbe por las hojas y raíces, con translocación acropétalo y basipétalo. Es empleado para el control de cercospora asparagi en el cultivo de espárrago.
COVERAGE 400 EC se prepara diluyendo la dosis en un poco de agua, luego se vierte esta solución al tanque de preparación, se agita y se completa con agua hasta el volumen deseado. Aplicar con cualquier equipo de aspersión terrestre.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	ENFERMEDADES		Dosis		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	lt/200 lt	lt/ha		
Espárrago	Cercosporiosis	<i>Cercospora asparagi</i>	0.5	1.0	14	0.01

P.C.: Periodo de carencia L.M.R.: Límites máximos de residuos

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN: Aplicar **COVERAGE 400 EC** al observarse los primeros síntomas de la enfermedad y repetir las aplicaciones a intervalos de 7 días durante periodos de humedad o ataques y cada 14 días en tiempos de estación. Se recomienda hasta un máximo de 2 aplicaciones por cultivo/campaña

PERIODO DE REINGRESO: No reingresar al campo tratado antes de 24 horas de realizada la aplicación.

FITOTOXICIDAD: **COVERAGE 400 EC** no es fitotóxico para el cultivo recomendado.

COMPATIBILIDAD: **COVERAGE 400 EC** es compatible con los plaguicidas de uso frecuente excepto con aquellos de reacción alcalina. La mezcla con concentrados emulsionables debe ser probada bajo condiciones de campo.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



COLORES: (CÓDIGO PANTONE DE LOS COLORES)		COLORES: NOMBRE COMERCIAL	
NEGRO	PANT. 293 CVC	PANT. C.80; Y:100	PANT. C:100 M:100 Y:26 K:25

COLORES LOGO NEO AGRUM		
PANT. 343 Verde Oscuro	PANT. 377 Verde Claro	PANT. 1375 Sol

NEGRO K:100
PANTONE 293 CVC C:100 M:56
PANT. AZUL N. COMERCIAL C:100 M:100 Y:26 K:25Ç
PANT. VERDE N. COMERCIAL C:80 Y:100
PANTONE 343 C:100 M:40 Y:100 K:37
PANTONE 377 C:30 Y:100 K:30
PANTONE 1375 M:27 Y:100

VERSIÓN: 01-S-5
ÚLTIMA REVISIÓN: 31-07-11