TRICOX® es un fungicida - nematicida biológico derivado de la fermentación de microorganismos del género Trichoderma spp. Sus ingredientes incluyen organismos vivos, complejos enzimáticos y nutrientes, los cuales benefician el crecimiento vegetal.
TRICOX® es recomendado para todo tipo de cultivos; ya que estimula el crecimiento radicular, promueve el crecimiento y desarrollo vegetal, promueve la floración y mejora la productividad y calidad de los cultivos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
Este producto es ligeramente toxico, tener en cuenta las siguientes medidas de precaución:
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas, ni forrajes.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación; y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Almacenar el producto en lugares frescos y bien ventilados.
- Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS
El producto es considerado inocuo pero en caso de ingestión accidental, llamar al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante 15 minutos, y si el contacto fuese con la piel, retirar la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.

TOXICOLOGÍA
Ligeramente tóxico
DI50 oral: > 5000 mg/kg

- **Antídoto: No requiere.**

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: 0-800-1-3040 ó 328 7398
ESSALUD: 0801-10200 ó 411 8000 (opción 4)
CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

NOTA AL COMPRADOR
El Titular de Registro, garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con la descripción indicada en la etiqueta y es apto para su uso siguiendo las instrucciones dadas.

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

MANTENGA ALEJADO DE LAS PERSONAS, ANIMALES, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MEDICINALES.

Tricox®

(Trichoderma)

Fungicida - Nematicida Biologico - Polvo Mojable (WP)

Composición Química:

Trichoderma koningii	3×10^7 conidias/g
Trichoderma harzianum	2×10^7 conidias/g
Magnesio	5×10^{-3} g/g
Manganeso	1×10^{-3} g/g
Zinc	1×10^{-3} g/g

FUNGICIDA - NEMATICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA

Registro PBUA Nº 162 SENASA

Titular de Registro: **SILVESTRE PERÚ S.A.C.**
Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú
Tel.: (01) 617-3300 Fax: (01) 617-3312
Correo electrónico: sec@silvestre.com.pe

Formulado y Envasado por: **JH BIOTECH, INC.**
4951 Olivas Park Drive Ventura, CA 93003 - USA.
Tel.: (805) 650 - 8933 Fax.: (805) 650 - 8942

Importado y Distribuido por: **SILVESTRE PERÚ S.A.C.**

Contenido Neto: **1 kg**
F. de Form:
Nº Lote:
F. de Venc:

Silvestre Protección Vegetal

LIGERAMENTE TÓXICO
PRECAUCIÓN

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
Puede ser aplicado con cualquier equipo de aplicación dirigida al cuello de planta o por el sistema de riego por goteo.

SISTEMA DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN
TRICOX® se emplea diluido en agua. Preparar una pre-mezcla, diluyendo la cantidad necesaria del producto en un balde, luego vaciar al recipiente definitivo y completar la cantidad de agua. Si es posible, dejar la solución reposando entre 5 a 6 horas antes de la aplicación. Esto ayudará a aumentar la activación del producto. Si es necesario agitar la solución durante la aplicación.
Se recomienda por lo menos dos aplicaciones por campaña para cultivos anuales y perennes.
Se recomienda realizar la aplicación al inicio del desarrollo del cultivo.

Cuadro de usos:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (kg/ha)	MOMENTO DE APLICACIÓN	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO				
ALCACHOFA	"Nematodo del nudo"	*Meloidogyne incognita*	1.5 - 2.75	Iniciar la aplicación 15 días después del transplante y una segunda aplicación, 30 días después de la primera.	---	---
ARÁNDANO	"Brazo Negro"	*Lasiodiplodia theobromae*	1.5	Antes que se presente la enfermedad.	---	---
CAFÉ	"Roya del café"	*Hemileia vastatrix*	1.0	Iniciar la aplicación en las primeras etapas fenológicas del cultivo	---	---
CEBOLLA	"Mildiu"	*Peronospora destructor*	1.0	Antes que se presente la enfermedad.	---	---
GRANADO	"Nemátodo del nudo"	*Meloidogyne incognita*	2.0	Antes que se presente la enfermedad.	---	---
MANDARINA	"Gomosis del cuello"	*Phytophthora nicotianae*	2.0	Antes que se presente la enfermedad.	---	---
PALTO	"Brazo negro"	*Lasiodiplodia thebromae*	2.0	Antes que se presente la enfermedad.	---	---
PIMIENTO	"Hielo azul"	*Phytophthora capsici*	1 - 2	Iniciar la aplicación en las primeras etapas fenológicas del cultivo o previa evaluación al inicio de la infestación de la plaga.	---	---
VID	"Oidium"	*Erysiphe necator*	1.5 - 2.0	Fructificación	---	---
	"Brazo negro"	*Lasiodiplodia thebromae*	2.0	Antes que se presente la enfermedad.	---	---
AJO	"Mildiu"	*Peronospora destructor*	1.0	Antes que se presente la enfermedad.	---	---
NARANJO	"Brazo negro"	*Lasiodiplodia thebromae*	2.0	Antes que se presente la enfermedad.	---	---
LIMON	"Brazo negro"	*Lasiodiplodia thebromae*	2.0	Antes que se presente la enfermedad.	---	---
QUINUA	"Mildiu"	*Peronospora farinosa*	2.0	Antes que se presente la enfermedad.	---	---

LMR: Límite Máximo Residuos **PC:** Período de Carencia **---:** No tiene.

COMPATIBILIDAD
TRICOX® es compatible con la mayoría de fungicidas, excepto los benzimidazoles como el benomil y carbendazim. Es incompatible con materiales fuertemente oxidantes, alcalinos y/o ácidos.

FITOTOXICIDAD
No es fitotóxico para los cultivos recomendados.

DESTRUYA ESTE ENVASE INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO.