

**TRICOX®** es un fungicida - nematicida biológico derivado de la fermentación de microorganismos del género *Trichoderma* spp. Sus ingredientes incluyen organismos vivos, complejos enzimáticos y nutrientes, los cuales benefician el crecimiento vegetal.

**TRICOX®** es recomendado para todo tipo de cultivos; ya que estimula el crecimiento radicular, promueve el crecimiento y desarrollo vegetal, promueve la floración y mejora la productividad y calidad de los cultivos.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

Este producto es ligeramente tóxico, tener en cuenta las siguientes medidas de precaución:

- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas, ni forrajes.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación; y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Almacenar el producto en lugares frescos y bien ventilados.
- Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

El producto es considerado inocuo pero en caso de ingestión accidental, llamar al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.

- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante 15 minutos, y si el contacto fuese con la piel, retirar la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.

**TOXICOLOGÍA**

Ligeramente tóxico  
DI50 oral: > 5000 mg/kg

- **Antídoto: No requiere.**

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**  
**CICOTOX: 0-800-1-3040 o 328 7398**  
**ESSALUD: 0801-10200 o 411 8000 (opción 4)**  
**CISPROQUIM: 0800-50847**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**NOTA AL COMPRADOR**

El Titular de Registro, garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con la descripción indicada en la etiqueta y es apto para su uso siguiendo las instrucciones dadas.

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**MANTENGA ALEJADO DE LAS PERSONAS, ANIMALES, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MEDICINALES.**



**Fungicida - Nematicida Biológico - Polvo Mojable (WP)**

**Composición Química:**

*Trichoderma koningii* ..... 3 x 10<sup>7</sup> conidias/g  
*Trichoderma harzianum* ..... 2 x 10<sup>7</sup> conidias/g  
Magnesio ..... 5 x 10<sup>-3</sup> g/g  
Manganeso ..... 1 x 10<sup>-3</sup> g/g  
Zinc ..... 1 x 10<sup>-3</sup> g/g

**FUNGICIDA - NEMATICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA**

**Registro PBUA N° 162 SENASA**

**Titular de Registro:** **SILVESTRE PERÚ S.A.C.**  
Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú  
Tel.: (01) 617-3300  
Correo electrónico: sec@silvestre.com.pe

**Formulado y Envasado por:** **JH BIOTECH, INC.**  
4951 Olivas Park Drive Ventura, CA 93003 - USA.  
Tel.: (805) 650 - 8933 Fax.: (805) 650 - 8942

**Importado y Distribuido por:** **SILVESTRE PERÚ S.A.C.**

Contenido Neto: **1 kg**

F. de Form:  
N° Lote:  
F. de Venc:



**LIGERAMENTE TÓXICO**  
**PRECAUCIÓN**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

Puede ser aplicado con cualquier equipo de aplicación dirigida al cuello de planta o por el sistema de riego por goteo.

**SISTEMA DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN**

**TRICOX®** se emplea diluido en agua. Preparar una pre-mezcla, diluyendo la cantidad necesaria del producto en un balde, luego vaciar al recipiente definitivo y completar la cantidad de agua. Si es posible, dejar la solución reposando entre 5 a 6 horas antes de la aplicación. Esto ayudará a aumentar la activación del producto. Si es necesario agitar la solución durante la aplicación. Se recomienda por lo menos dos aplicaciones por campaña para cultivos anuales y perennes. Se recomienda realizar la aplicación al inicio del desarrollo del cultivo.

**Cuadro de usos:**

| CULTIVO   | PLAGA                |                                 | DOSIS (kg/ha) | MOMENTO DE APLICACIÓN                                                                                                             | PC (días) | LMR (ppm) |
|-----------|----------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|           | NOMBRE COMÚN         | NOMBRE CIENTÍFICO               |               |                                                                                                                                   |           |           |
| AJO       | "Mildiu"             | <i>Peronospora destructor</i>   | 1             | ---                                                                                                                               | ---       | ---       |
| ALCACHOFA | "Nematodo del nudo"  | <i>Meloidogyne incognita</i>    | 1.5- 2.75     | Iniciar la aplicación 15 días después del trasplante y una segunda aplicación, 30 días después de la primera.                     | ---       | ---       |
| ARÁNDANO  | "Brazo Negro"        | <i>Lasiodiplodia theobromae</i> | 1.5           | Antes que se presente la enfermedad.                                                                                              | ---       | ---       |
| CAFÉ      | "Roya del café"      | <i>Hemileia vastatrix</i>       | 1.0           | Iniciar la aplicación en las primeras etapas fenológicas del cultivo                                                              | ---       | ---       |
| CEBOLLA   | "Mildiu"             | <i>Peronospora destructor</i>   | 1.0           | Antes que se presente la enfermedad.                                                                                              | ---       | ---       |
| DURAZNO   | "Brazo negro"        | <i>Lasiodiplodia theobromae</i> | 2.0           | ---                                                                                                                               | ---       | ---       |
| ESPÁRRAGO | "Mancha púrpura"     | <i>Stemphylium vesicarium</i>   | 1.0           | ---                                                                                                                               | ---       | ---       |
| FRESA     | "Oidium"             | <i>Podosphaera macularis</i>    | 1.0           | ---                                                                                                                               | ---       | ---       |
| GRANADO   | "Nematodo del nudo"  | <i>Meloidogyne incognita</i>    | 2.0           | Antes que se presente la enfermedad.                                                                                              | ---       | ---       |
| LIMÓN     | "Brazo negro"        | <i>Lasiodiplodia theobromae</i> | 2.0           | Antes que se presente la enfermedad.                                                                                              | ---       | ---       |
| MANDARINA | "Gomosis del cuello" | <i>Phytophthora nicotianae</i>  | 2.0           | Antes que se presente la enfermedad.                                                                                              | ---       | ---       |
| MANZANO   | "Brazo negro"        | <i>Lasiodiplodia theobromae</i> | 2.0           | ---                                                                                                                               | ---       | ---       |
| NARANJO   | "Brazo negro"        | <i>Lasiodiplodia theobromae</i> | 2.0           | Antes que se presente la enfermedad.                                                                                              | ---       | ---       |
| PALTO     | "Brazo negro"        | <i>Lasiodiplodia theobromae</i> | 2.0           | Antes que se presente la enfermedad.                                                                                              | ---       | ---       |
| PIMIENTO  | "Hielo azul"         | <i>Phytophthora capsici</i>     | 1 - 2         | Iniciar la aplicación en las primeras etapas fenológicas del cultivo o previa evaluación al inicio de la infestación de la plaga. | ---       | ---       |
| QUINUA    | "Mildiu"             | <i>Peronospora farinosa</i>     | 2.0           | ---                                                                                                                               | ---       | ---       |
| VID       | "Oidiosis"           | <i>Erysiphe necator</i>         | 1.5 - 2.0     | Fructificación                                                                                                                    | ---       | ---       |
|           | "Brazo negro"        | <i>Lasiodiplodia theobromae</i> | 2.0           | Antes que se presente la enfermedad.                                                                                              | ---       | ---       |
| CACAO     | "Moniliasis"         | <i>Monilinia fruticola</i>      | 2.0           | Antes que se presente la enfermedad.                                                                                              | ---       | ---       |

**LMR:** Límite Máximo Residuos

**COMPATIBILIDAD**

**TRICOX®** es compatible con la mayoría de fungicidas, excepto los benzimidazoles como el benomil y carbendazim. Es incompatible con materiales fuertemente oxidantes, alcalinos y/o ácidos.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico para los cultivos recomendados.

**PC:** Periodo de Carencia ---: No tiene.

**DESTRUYA ESTE ENVASE INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO.**

