

LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico si se ingiere o es inhalado. Evite el contacto con la piel y ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. envase concuerda con la descripción indicada en la etiqueta y es apto para su uso siguiendo las instrucciones dadas.

PRIMEROS AUXILIOS

TRICOX® *Trichoderma koningii*, *Trichoderma harzianum*

- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta y/o hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: 0-800-1-3040 o 328 7398
ESSALUD: 0801-10200 o 411 8000 (opción 4)
CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- TRICOX® es un producto no tóxico para aves, peces y organismos acuáticos. El producto es no tóxico para abejas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.



AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO MICROBIANO

FUNGICIDA - NEMATICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable (WP)

Composición:
Trichoderma koningii : 3 x 10⁷ conidias/g
Trichoderma harzianum : 2 x 10⁷ conidias/g
Magnesio : 5 x 10⁻³ g/g
Manganeso : 1 x 10⁻³ g/g
Zinc : 1 x 10⁻³ g/g

Registro PBUA N° 162 SENASA



Titular de Registro:

SILVESTRE PERÚ S.A.C.
Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú
Tel.: (01) 617-3300
Correo electrónico: sec@silvestre.com.pe

Contenido Neto:

1 kg

F. de Form:
N° Lote:
F. de Venc:

Importado y Distribuido por:

SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Formulado por:

JH BIOTECH, INC.
4951 Olivas Park Drive Ventura, CA 93003 - USA.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE TÓXICO
PRECAUCIÓN



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Puede ser aplicado con cualquier equipo de aplicación dirigida al cuello de planta o por el sistema de riego por goteo.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cuadro de usos:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (kg/ha)	DOSIS (kg/200L)	MOMENTO DE APLICACIÓN	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO					
AJO	"Mildiu"	<i>Peronospora destructor</i>	1	—	Iniciar la aplicación en las primeras etapas del cultivo o previa evaluación al inicio de la infestación de la plaga.	---	---
ALCACHOFA	"Nematodo del nudo"	<i>Meloidogyne incognita</i>	1.5- 2.75	—	Iniciar la aplicación 15 días después del trasplante y una segunda aplicación, 30 días después de la primera.	---	---
ARÁNDANO	"Brazo Negro"	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	1.5	—	Antes que se presente la enfermedad.	---	---
CACAO	"Moniliasis"	<i>Monilia fruticola</i>	2.0	—	Iniciar la aplicación en las primeras etapas fenológicas del cultivo	---	---
CAFÉ	"Roya del café"	<i>Hemileia vastatrix</i>	1.0	—	Iniciar la aplicación en las primeras etapas fenológicas del cultivo	---	---
CEBOLLA	"Mildiu"	<i>Peronospora destructor</i>	1.0	—	Antes que se presente la enfermedad.	---	---
DURAZNO	"Brazo negro"	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	2.0	—	Antes de presentarse los síntomas de la enfermedad.	---	---
ESPÁRRAGO	"Mancha púrpura"	<i>Stemphylium vesicarium</i>	1.0	—	Antes de presentarse los síntomas de la enfermedad.	---	---
FRESA	"Oidium"	<i>Podosphaera macularis</i>	1.0	—	Antes de presentarse los síntomas de la enfermedad.	---	---
GRANADILLA	"Brazo negro"	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	2.0	—	Antes de presentarse los síntomas de la enfermedad.	---	---
GRANADO	"Brazo negro"	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	2.0	—	Antes que se presente la enfermedad.	---	---
	"Nematodo del nudo"	<i>Meloidogyne incognita</i>	2.0	—	Antes que se presente la enfermedad.	---	---
LIMÓN	"Brazo negro"	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	2.0	—	Antes que se presente la enfermedad.	---	---
LÚCUMO	"Brazo negro"	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	2.0	—	Antes que se presente la enfermedad.	---	---
MANDARINA	"Gomosis del cuello"	<i>Phytophthora nicotianae</i>	2.0	—	Antes que se presente la enfermedad.	---	---
MANGO	"Oidiosis"	<i>Oidium mangifera</i>	2.0	—	Antes que se presente la enfermedad.	---	---
MANZANO	"Brazo negro"	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	2.0	—	Antes que se presente la enfermedad.	---	---
MARACUYÁ	"Brazo negro"	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	2.0	—	Antes que se presente la enfermedad.	---	---
NARANJO	"Brazo negro"	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	2.0	—	Antes que se presente la enfermedad.	---	---
PALTO	"Brazo negro"	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	2.0	—	Antes que se presente la enfermedad.	---	---
PERA	"Brazo negro"	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	2.0	—	Antes que se presente la enfermedad.	---	---
PIMIENTO	"Hielo azul"	<i>Phytophthora capsici</i>	1 - 2	—	Iniciar la aplicación en las primeras etapas fenológicas del cultivo o previa evaluación al inicio de la infestación de la plaga.	---	---
QUINUA	"Mildiu"	<i>Peronospora farinosa</i>	2.0	—	Iniciar la aplicación en las primeras etapas fenológicas del cultivo o previa evaluación al inicio de la infestación de la plaga.	---	---
VID	"Oidiosis"	<i>Erysiphe necator</i>	1.5 - 2.0	—	Antes de presentarse los síntomas de la enfermedad.	---	---
	"Brazo negro"	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	2.0	—	Antes de presentarse los síntomas de la enfermedad.	---	---
	"Mildiu"	<i>Plasmopara viticola</i>	1.5	—	Antes de presentarse los síntomas de la enfermedad.	---	---

TRATAMIENTO POST-COSECHA

VID	"Pudrición gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	—	1.0	Iniciar la aplicación en cosecha o previa evaluación al inicio de la infestación de la plaga.	---	---
-----	------------------	-------------------------	---	-----	---	-----	-----

PC: Período de Carenia

---: No tiene

LMR: Límite Máximo Residuos

