

**LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es tóxico si se ingiere o es inhalado. Evite el contacto con la piel y ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. envase concuerda con la descripción indicada en la etiqueta y es apto para su uso siguiendo las instrucciones dadas.

**PRIMEROS AUXILIOS**

**TRICOX®** *Trichoderma koningii*, *Trichoderma harzianum*

- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta y/o hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**  
CICOTOX: 0-800-1-3040 o 328 7398  
ESSALUD: 0801-10200 o 411 8000 (opción 4)  
CISPROQUIM: 0800-50847

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- **TRICOX®** es un producto no tóxico para aves, peces y organismos acuáticos. El producto es no tóxico para abejas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.



**AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO MICROBIANO**

**FUNGICIDA - NEMATICIDA AGRÍCOLA**

**Polvo Mojable (WP)**

**Composición:**

*Trichoderma koningii* : 3 x 10<sup>7</sup> conidias/g  
*Trichoderma harzianum* : 2 x 10<sup>7</sup> conidias/g  
Aditivos.....cps 1Kg

**Registro PBUA N° 162 SENASA**



**Titular de Registro:**

**SILVESTRE PERÚ S.A.C.**  
Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú  
Tel.: (01) 617-3300  
Correo electrónico: sec@silvestre.com.pe

Contenido Neto: **1 kg**  
F. de Form:  
N° Lote:  
F. de Venc:

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**PRECAUCIÓN**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

Puede ser aplicado con cualquier equipo de aplicación dirigida al cuello de planta o por el sistema de riego por goteo.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

**Cuadro de usos:**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (kg/ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
AJO	"Mildiu"	<i>Peronospora destructor</i>	1	N.A.	N.A.
ALCACHOFA	"Nematodo del nudo"	<i>Meloidogyne incognita</i>	1.5- 2.75	N.A.	N.A.
	"Brazo Negro"	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	1.5	N.A.	N.A.
ARÁNDANO	"Podrición gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	2.0	N.A.	N.A.
	"Roya del café"	<i>Hemileia vastatrix</i>	1.0	N.A.	N.A.
CAFÉ	"Mildiu"	<i>Peronospora destructor</i>	1.0	N.A.	N.A.
DURAZNO	"Brazo negro"	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	2.0	N.A.	N.A.
ESPÁRRAGO	"Mancha púrpura"	<i>Stemphylium vesicarium</i>	1.0	N.A.	N.A.
FRESA	"Oidium"	<i>Podosphaera macularis</i>	1.0	N.A.	N.A.
GRANADILLA	"Brazo negro"	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	2.0	N.A.	N.A.
	"Brazo negro"	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	2.0	N.A.	N.A.
GRANADO	"Nemátodo del nudo"	<i>Meloidogyne incognita</i>	2.0	N.A.	N.A.
	"Brazo negro"	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	2.0	N.A.	N.A.
LIMÓN	"Brazo negro"	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	2.0	N.A.	N.A.
LÚCUMO	"Brazo negro"	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	2.0	N.A.	N.A.
MANDARINA	"Gomosis del cuello"	<i>Phytophthora nicotianae</i>	2.0	N.A.	N.A.
MANGO	"Oidiosis"	<i>Oidium mangifera</i>	2.0	N.A.	N.A.
MANZANO	"Brazo negro"	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	2.0	N.A.	N.A.
MARACUYÁ	"Brazo negro"	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	2.0	N.A.	N.A.
NARANJO	"Brazo negro"	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	2.0	N.A.	N.A.
PALTO	"Brazo negro"	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	2.0	N.A.	N.A.
PERA	"Brazo negro"	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	2.0	N.A.	N.A.
PIMIENTO	"Hielo azul"	<i>Phytophthora capsici</i>	1 - 2	N.A.	N.A.
QUINUA	"Mildiu"	<i>Peronospora farinosa</i>	2.0	N.A.	N.A.
	"Oidiosis"	<i>Erysiphe necator</i>	1.5 - 2.0	N.A.	N.A.
	"Brazo negro"	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	2.0	N.A.	N.A.
VID	"Mildiu"	<i>Plasmopara viticola</i>	1.5	N.A.	N.A.
	"Moniliasis"	<i>Monilia fruticola</i>	2.0	N.A.	N.A.

PC: Período de Carencia

LMR: Límite Máximo Residuos dadas  
N.A.: No aplica

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Iniciar la aplicación en las primeras etapas del cultivo o previa evaluación al inicio de la infestación de la plaga

Antes que se presente la enfermedad  
En alcachofa se recomienda realizar una aplicación 15 días después del trasplante una segunda aplicación 30 días después de la primera

**PERÍODO DE REINGRESO**

Puede reingresar al campo sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto.  
En caso se requiera ingresar al campo antes de lo cumplido este período, deberá usar equipo de protección

**COMPATIBILIDAD**

TRICOX® es compatible con la mayoría de fungicidas, excepto con aguas con carbonato, los benzimidazole como benomil y carbendazim. Es incompatible con materiales fuertemente oxidantes, alcalinos y/o ácidos. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad

**FITOTOXICIDAD**

TRICOX® no es fitotóxico en los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en las etiquetas y que, es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones

