



Etiqueta
TRICOX - JH BIOTECH

Revisión: 00
Aprobado: JR
Fecha: 21-03-17
Página: 2 de 2

38,5 ± 0,3

1,1 ± 0,2

1,2 ± 0,2

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES:

- Este producto es un fungicida y nematocida agrícola.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- envases concuerda con la descripción indicada en la etiqueta y es apto para su uso siguiendo las instrucciones dadas.

PRIMEROS AUXILIOS

TRICOX Trichoderma koningii, Trichoderma harzianum

- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta y/o hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

TELEFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: 328 7398
ESSALUD: +11 8000 (opción 4)
CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- TRICOX® es un producto no tóxico para aves, peces y organismos acuáticos. El producto es no tóxico para abejas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO MICROBIANO
FUNGICIDA - NEMATICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

Composición:
Trichoderma koningii : 3 x 10⁹ conidias/g
Trichoderma harzianum : 2 x 10⁹ conidias/g
Magnesio : 5 x 10³ g/g
Manganeso : 1 x 10³ g/g
Zinc : 1 x 10³ g/g

Registro PQUA N° 1416 - SENASA

Titular de Registro:
SILVESTRE PERU S.A.C
Calle Arica 242 Miraflores, Lima 18 - Perú
Telf.: (01) 617 - 3300

Importado y Distribuido por:
SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Formulado por:
JH BIOTECH, INC.
4951 Olivias Park Drive Ventura, CA 93003 - USA.

Contenido Neto: 1 Kg

F. de Form:
N° Lote:
F. de Venc:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

LIGERAMENTE TÓXICO PRECAUCIÓN

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
Puede ser aplicado con cualquier equipo de aplicación dirigida al cuello de planta o por el sistema de riego por goteo. **"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DOSES (kg/ha)	MOMENTO DE APLICACIÓN	PC (días)	LMR (ppm)
AJO	"Maíz"	Peronospora destructor	1	Iniciar la aplicación en las primeras etapas del cultivo o previa implantación al inicio de la temporada de siembra.	---	---
ALCACHOFA	"Nematodo del nudo"	Meloidogyne incognita	1.5 - 2.75	Iniciar la aplicación 15 días después del trasplante y una segunda aplicación, 30 días después de la primera.	---	---
ARANDANO	"Brazo Negro"	Lasiodiplodia theobromae	1.5	Antes que se presente la enfermedad.	---	---
CACAO	"Mochales"	Mutisia floricola	2.0	Iniciar la aplicación en las primeras etapas fenológicas del cultivo.	---	---
CAFÉ	"Roya del café"	Hemileia vastatrix	1.0	Iniciar la aplicación en las primeras etapas fenológicas del cultivo.	---	---
CEBOLLA	"Maíz"	Peronospora destructor	1.0	Antes que se presente la enfermedad.	---	---
DURAZNO	"Brazo negro"	Lasiodiplodia theobromae	2.0	Antes de presentarse los síntomas de la enfermedad.	---	---
ESPÁRRAGO	"Mancha púrpura"	Stemphylium vesicarium	1.0	Antes de presentarse los síntomas de la enfermedad.	---	---
FRESA	"Oidium"	Phodaphera macularis	1.0	Antes de presentarse los síntomas de la enfermedad.	---	---
GRANADILLA	"Brazo negro"	Lasiodiplodia theobromae	2.0	Antes de presentarse los síntomas de la enfermedad.	---	---
GRANADILLA	"Brazo negro"	Lasiodiplodia theobromae	2.0	Antes que se presente la enfermedad.	---	---
GRANADO	"Nematodo del nudo"	Meloidogyne incognita	2.0	Antes que se presente la enfermedad.	---	---
LIMÓN	"Brazo negro"	Lasiodiplodia theobromae	2.0	Antes que se presente la enfermedad.	---	---
LUCUMO	"Brazo negro"	Lasiodiplodia theobromae	2.0	Antes que se presente la enfermedad.	---	---
MANDARINA	"Goniosis del cuello"	Phytophthora nicotianae	2.0	Antes que se presente la enfermedad.	---	---
MANGO	"Oidium"	Oidium mangiferae	2.0	Antes que se presente la enfermedad.	---	---
MANZANO	"Brazo negro"	Lasiodiplodia theobromae	2.0	Antes que se presente la enfermedad.	---	---
MARACUYÁ	"Brazo negro"	Lasiodiplodia theobromae	2.0	Antes que se presente la enfermedad.	---	---
NARANJO	"Brazo negro"	Lasiodiplodia theobromae	2.0	Antes que se presente la enfermedad.	---	---
PALTO	"Brazo negro"	Lasiodiplodia theobromae	2.0	Antes que se presente la enfermedad.	---	---
PIÑA	"Brazo negro"	Lasiodiplodia theobromae	2.0	Antes que se presente la enfermedad.	---	---
PIÑA	"Helo azul"	Phytophthora azuulii	1 - 2	Iniciar la aplicación en las primeras etapas fenológicas del cultivo o previa evaluación al inicio de la infestación de la plaga.	---	---
QUINUA	"Maíz"	Peronospora fruticosa	2.0	Iniciar la aplicación en las primeras etapas fenológicas del cultivo o previa evaluación al inicio de la infestación de la plaga.	---	---
VID	"Oidium"	Erysiphe necator	1.5 - 2.0	Antes de presentarse los síntomas de la enfermedad.	---	---
	"Brazo negro"	Lasiodiplodia theobromae	2.0	Antes de presentarse los síntomas de la enfermedad.	---	---
VID	"Maíz"	Plasmopara viticola	1.5	Antes de presentarse los síntomas de la enfermedad.	---	---

TRATAMIENTO POST - COSECHA

PALTO	"Antracnosis"	Colletotrichum gloeosporioides	1.0	Por inmersión.	---	---
VID	"Podredumbre gris"	Botrytis cinerea	1.0	Por inmersión.	---	---

PC: Período de Carenza (días) ---: No tiene LMR: Límite Máximo Residuo (ppm: partes por millón)

11,3 ± 0,3

1,6

L.TRICOX	L.TRICOX	L. SILVESTRE L. TRICOX T. LAVADO B. TOXICOLÓGICA	T. LAVADO	TEXTO
PANTONE 152 C	PANTONE 382 C	PANTONE 348 C	PANTONE 293 C	P. Process Black

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del CSGG del GRUPO SILVESTRE