



**Etiqueta**  
**TRICOX - JH BIOTECH**

Revisión: 01  
Aprobado: JR  
Fecha: 05-06-18  
Página: 2 de 2

38,5 ± 0,3

1,1 ± 0,2

1,2 ± 0,2

**LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE. FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es tóxico si se ingiere o es inhalado. Evite el contacto con la piel y ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Envase concuerda con la descripción indicada en la etiqueta y es apto para su uso siguiendo las instrucciones dadas.

**PRIMEROS AUXILIOS**

**TRICOX** Trichoderma koningii, Trichoderma harzianum

- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta y/o hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**  
CICOTOX: 328 7398  
ESSALUD: 411 8000 (opción 4)  
CSPROQUIM: 0800-50847

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios designados por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- TRICOX es un producto no tóxico para aves, peces y organismos acuáticos. El producto es no tóxico para abejas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.

**AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO MICROBIANO**  
**FUNGICIDA - NEMATICIDA AGRÍCOLA**

**POLVO MOJABLE (WP)**

**Composición:**  
Trichoderma koningii : 3 x 10<sup>10</sup> conidias/g  
Trichoderma harzianum : 2 x 10<sup>10</sup> conidias/g

**Registro PQUA N° 1416 - SENASA**

**Importado y Distribuido por:**  
SILVESTRE PERÚ S.A.C.

**Formulado por:**  
JH BIOTECH, INC.  
4951 Olivias Park Drive Ventura, CA 93003 - USA.

**Titular de Registro:**  
SILVESTRE PERU S.A.C  
Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú  
Telf.: (01) 617 - 3300

**Contenido Neto: 1 Kg**

F. de Form:  
N° Lote:  
F. de Venc:

**NO CORROSIVO      NO INFLAMABLE      NO EXPLOSIVO**

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA	DOSES (kg/ha)	MOMENTO DE APLICACIÓN	PC (días)	LMR (ppm)
AJO	"Mitoú"	Peronospora destructor	1	Iniciar la aplicación en las primeras etapas del cultivo o previa a la siembra.	NA, NA
ALCACHOFA	"Nematodo del nudo"	Meloidogyne incognita	1.5 - 2.75	Iniciar la aplicación 15 días después del trasplante y una segunda aplicación, 30 días después de la primera.	NA, NA
ARANDANO	"Brazo Negro"	Lasiodiplodia theobromae	1.5	Antes que se presente la enfermedad.	NA, NA
CACAO	"Mochales"	Mutisia floricola	2.0	Iniciar la aplicación en las primeras etapas fenológicas del cultivo.	NA, NA
CAFÉ	"Roya del café"	Hemileia vastatrix	1.0	Iniciar la aplicación en las primeras etapas fenológicas del cultivo.	NA, NA
CEBOLLA	"Mitoú"	Peronospora destructor	1.0	Antes que se presente la enfermedad.	NA, NA
DURAZNO	"Brazo negro"	Lasiodiplodia theobromae	2.0	Antes de presentarse los síntomas de la enfermedad.	NA, NA
ESPÁRRAGO	"Mancha purpura"	Stemphylium vesicarium	1.0	Antes de presentarse los síntomas de la enfermedad.	NA, NA
FRESA	"Oidium"	Phodaphera macularis	1.0	Antes de presentarse los síntomas de la enfermedad.	NA, NA
GRANADILLA	"Brazo negro"	Lasiodiplodia theobromae	2.0	Antes de presentarse los síntomas de la enfermedad.	NA, NA
GRANADO	"Nematodo del nudo"	Meloidogyne incognita	2.0	Antes que se presente la enfermedad.	NA, NA
LIMÓN	"Brazo negro"	Lasiodiplodia theobromae	2.0	Antes que se presente la enfermedad.	NA, NA
LUCUMO	"Brazo negro"	Lasiodiplodia theobromae	2.0	Antes que se presente la enfermedad.	NA, NA
MANDARINA	"Gonosis del cuerno"	Phytophthora nicotianae	2.0	Antes que se presente la enfermedad.	NA, NA
MANGO	"Oidium"	Oidium mangifera	2.0	Antes que se presente la enfermedad.	NA, NA
MANZANO	"Brazo negro"	Lasiodiplodia theobromae	2.0	Antes que se presente la enfermedad.	NA, NA
MARACUYÁ	"Brazo negro"	Lasiodiplodia theobromae	2.0	Antes que se presente la enfermedad.	NA, NA
NARANJO	"Brazo negro"	Lasiodiplodia theobromae	2.0	Antes que se presente la enfermedad.	NA, NA
PALTO	"Brazo negro"	Lasiodiplodia theobromae	2.0	Antes que se presente la enfermedad.	NA, NA
PIÑA	"Brazo negro"	Lasiodiplodia theobromae	2.0	Antes que se presente la enfermedad.	NA, NA
PIRENA	"Mitoú azul"	Phytophthora capsici	1 - 2	Iniciar la aplicación en las primeras etapas fenológicas del cultivo o previa evaluación al inicio de la infestación de la plaga.	NA, NA
PIRENO	"Mitoú"	Peronospora fronsca	2.0	Iniciar la aplicación en las primeras etapas fenológicas del cultivo o previa evaluación al inicio de la infestación de la plaga.	NA, NA
QUINUA	"Oidium"	Erysiphe necator	1.5 - 2.0	Antes de presentarse los síntomas de la enfermedad.	NA, NA
VID	"Brazo negro"	Lasiodiplodia theobromae	2.0	Antes de presentarse los síntomas de la enfermedad.	NA, NA
	"Mitoú"	Plasmopara viticola	1.5	Antes de presentarse los síntomas de la enfermedad.	NA, NA

**TRATAMIENTO POST - COSECHA**

CULTIVO	PLAGA	DOSES (kg/ha)	MOMENTO DE APLICACIÓN	PC (días)	LMR (ppm)
PALTO	"Antracnosis"	Oidium viticola	1.0	Por inmersión.	NA, NA
VID	"Podredumbre gris"	Botrytis cinerea	1.0	Por inmersión.	NA, NA

PC: Período de Carenza (días)      N.A.: No tiene      LMR: Límite Máximo Residuo (ppm: partes por millón)

**PRECAUCIÓN**

L.TRICOX

PANTONE 152 C

L.TRICOX

PANTONE 382 C

L. SILVESTRE  
L. TRICOX  
T. LAVADO  
B. TOXICOLÓGICA

PANTONE 348 C

T. LAVADO

PANTONE 293 C

TEXTO

P. Process Black

**CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del CSGC del GRUPO SILVESTRE**