

1,1 ± 0,2
38,5 ± 0,3
1,2 ± 0,2

11,3 ± 0,3
1,6

LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico si se ingiere o es inhalado. Evite el contacto con la piel y ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

TRICOX *Trichoderma koningii*, *Trichoderma harzianum*

- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta y/o hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
 CICOTOX: 323 7398
 ESSALUD: 411 8000 (opción 4)
 CISPROQUIM: 0800-56847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- TRICOX** es un producto no tóxico para aves, peces y organismos acuáticos. El producto es no tóxico para abejas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.



AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO MICROBIANO
FUNGICIDA - NEMATICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

Composición:
Trichoderma koningii : 3 x 10⁷ conidias/g
Trichoderma harzianum : 2 x 10⁷ conidias/g

Registro PBUA N° 162 SENASA



Titular de Registro:
 SILVESTRE PERU S.A.C
 Calle Arica 242 Miraflores, Lima 18 - Perú
 Telf.: (01) 617 - 3300

Importado y Distribuido por:
 SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Formulado por:
 JH BIOTECH, INC.
 4951 Olivas Park Drive Ventura, CA 93003 - USA.

Contenido Neto: 1 Kg

F. de Form:
 N° Lote:
 F. de Venc:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
 Puede ser aplicado con cualquier equipo de aplicación dirigida al cuello de planta o por el sistema de riego por goteo.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (kg/ha)	MOMENTO DE APLICACIÓN	PC (días)	LMR (ppm)
AJO	"Nematodo del nudo"	1	Iniciar la aplicación en las primeras etapas del cultivo o previa evaluación al inicio de la plantación de la planta.	N.A.	N.A.
ALCACHOFA	"Podrido del nudo"	1,5 - 2,75	Iniciar la aplicación 15 días después del trasplante y una segunda aplicación 30 días después de la primera.	N.A.	N.A.
ARANDANO	"Podrido gris"	2,0	Antes que se presente la enfermedad.	N.A.	N.A.
ARANDANO	"Brazo Negro"	2,0	Antes que se presente la enfermedad.	N.A.	N.A.
CACAO	"Moniliasis"	2,0	Iniciar la aplicación en las primeras etapas fenológicas del cultivo.	N.A.	N.A.
CAFÉ	"Roya del café"	1,0	Iniciar la aplicación en las primeras etapas fenológicas del cultivo.	N.A.	N.A.
CEBOLLA	"Midu"	1,0	Antes que se presente la enfermedad.	N.A.	N.A.
DURAZNO	"Brazo negro"	2,0	Antes de presentarse los síntomas de la enfermedad.	N.A.	N.A.
ESPARRAGO	"Mancha púrpura"	1,0	Antes de presentarse los síntomas de la enfermedad.	N.A.	N.A.
FRESA	"Oídio"	1,0	Antes de presentarse los síntomas de la enfermedad.	N.A.	N.A.
GRANADILLA	"Brazo negro"	2,0	Antes de presentarse los síntomas de la enfermedad.	N.A.	N.A.
GRANADO	"Brazo negro"	2,0	Antes que se presente la enfermedad.	N.A.	N.A.
GRANADO	"Nematodo del nudo"	2,0	Antes que se presente la enfermedad.	N.A.	N.A.
LIMÓN	"Brazo negro"	2,0	Antes que se presente la enfermedad.	N.A.	N.A.
LUCUMO	"Brazo negro"	2,0	Antes que se presente la enfermedad.	N.A.	N.A.
MANDARINA	"Gomosis del cuello"	2,0	Antes que se presente la enfermedad.	N.A.	N.A.
MANGO	"Oídio"	2,0	Antes que se presente la enfermedad.	N.A.	N.A.
MANZANO	"Brazo negro"	2,0	Antes que se presente la enfermedad.	N.A.	N.A.
MARACUYÁ	"Brazo negro"	2,0	Antes que se presente la enfermedad.	N.A.	N.A.
NARANJO	"Brazo negro"	2,0	Antes que se presente la enfermedad.	N.A.	N.A.
PALTO	"Brazo negro"	2,0	Antes que se presente la enfermedad.	N.A.	N.A.
PERA	"Brazo negro"	2,0	Antes que se presente la enfermedad.	N.A.	N.A.
PIMIENTO	"Helo azul"	1 - 2	Iniciar la aplicación en las primeras etapas fenológicas del cultivo o previa evaluación al inicio de la plantación de la planta.	N.A.	N.A.
QUINUA	"Midu"	2,0	Iniciar la aplicación en las primeras etapas fenológicas del cultivo o previa evaluación al inicio de la plantación de la planta.	N.A.	N.A.
VID	"Oídio"	1,5 - 2,0	Antes de presentarse los síntomas de la enfermedad.	N.A.	N.A.
VID	"Brazo negro"	2,0	Antes de presentarse los síntomas de la enfermedad.	N.A.	N.A.
VID	"Midu"	1,5	Antes de presentarse los síntomas de la enfermedad.	N.A.	N.A.

TRATAMIENTO POST - COSECHA

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (kg/ha)	MOMENTO DE APLICACIÓN	PC (días)	LMR (ppm)
PALTO	"Antracnosis"	1,0	Por inmersión.	N.A.	N.A.
VID	"Podredumbre gris"	1,0	Por inmersión.	N.A.	N.A.

PC: Período de Carencia (días) LMR: Límite Máximo Residuo (ppm: partes por millón)

PRECAUCIÓN





CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del CSGG del GRUPO SILVESTRE