

**TRICOX®** es un fungicida - nematicida biológico derivado de la fermentación de microorganismos del género *Trichoderma spp.* Sus ingredientes incluyen organismos vivos, complejos enzimáticos y nutrientes, los cuales benefician el crecimiento vegetal.

**TRICOX®** es recomendado para todo tipo de cultivos; ya que estimula el crecimiento radicular, promueve el crecimiento y desarrollo vegetal, promueve la floración y mejora la productividad y calidad de los cultivos.

**PRECAUCIONES, MANIPULEO, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE**

Este producto es ligeramente tóxico, tener en cuenta las siguientes medidas de precaución:

- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar, ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas, ni forrajes.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación; y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Almacenar el producto en lugares frescos y bien ventilados.
- Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

El producto es considerado inocuo pero en caso de ingestión accidental, llamar al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.

- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante 15 minutos, y si el contacto fuese con la piel, retirar la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- **Antídoto:** No requiere.

**TOXICOLOGÍA**

Ligeramente tóxico  
DL<sub>50</sub> oral: > 5000 mg/kg

**INDICATIVOS DE USO**

Puede ser aplicado con cualquier equipo de aplicación dirigida al cuello de planta o por el sistema de riego por goteo.



(Trichoderma) ®

**Fungicida - Nematicida Biológico - Polvo Mojable (WP)**

**Composición Química:**

<i>Trichoderma koningii</i> .....	3 x 10 <sup>7</sup> conidias/g
<i>Trichoderma harzianum</i> .....	2 x 10 <sup>7</sup> conidias/g
Magnesio .....	5 x 10 <sup>-3</sup> g/g
Manganeso .....	1 x 10 <sup>-3</sup> g/g
Zinc .....	1 x 10 <sup>-3</sup> g/g

**FUNGICIDA - NEMATICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA**

**Registro PBUA N° 162 SENASA**

**Titular de Registro:**

**SILVESTRE PERÚ S.A.C.**  
Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú  
Tel.: (01) 617-3300 Fax: (01) 617-3312  
Correo electrónico: sec@grupossilvestre.com.pe

**Formulado y Envasado por:**

**JH BIOTECH, INC.**  
4951 Olivas Park Drive Ventura, CA 93003 - USA.  
Tel.: (805) 650 - 8933 Fax.: (805) 650 - 8942

**Importado y Distribuido por:**

**SILVESTRE PERÚ S.A.C.**

Contenido Neto: **1Kg**  
N°Lote  
F.deForm.  
F.deVenc.



**No Explosivo**

**No Corrosivo**

**No Inflamable**

**SISTEMA DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN**

**TRICOX®** se emplea diluido en agua. Preparar una pre-mezcla, diluyendo la cantidad necesaria del producto en un balde, luego vaciar al recipiente definitivo y completar la cantidad de agua. Si es posible, dejar la solución reposando entre 5 a 6 horas antes de la aplicación. Esto ayudará a aumentar la activación del producto. Si es necesario agitar la solución durante la aplicación.

Se recomienda por lo menos dos aplicaciones por campaña para cultivos anuales y perennes. Se recomienda realizar la aplicación al inicio del desarrollo del cultivo.

**COMPATIBILIDAD**

**TRICOX®** es compatible con la mayoría de fungicidas, excepto los benzimidazoles como el benomil y carbendazim. Es incompatible con materiales fuertemente oxidantes, alcalinos y/o ácidos.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico para los cultivos recomendados.

**Cuadro de dosificaciones:**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (Kg/ha)	MOMENTO DE APLICACIÓN	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO				
ALCACHOFA	"Nematodo del nudo"	<i>Meloidogyne incognita</i>	1.5 - 2.75	Iniciar la aplicación 15 días después del trasplante y una segunda aplicación, 30 días después de la primera.	---	---
PIMIENTO		<i>Phytophthora capsici</i>	1 - 2	Iniciar la aplicación en las primeras etapas fenológicas del cultivo o previa evaluación al inicio de la infestación de la plaga.	---	---
VID	"Oidiosis"	<i>Erysiphe necator</i>	1.5 - 2	Floración	---	---
GRANADO	"Nematodo del nudo"	<i>Meloidogyne incognita</i>	2	Antes que se presente la enfermedad	---	---

LMR: Límite Máximo Residuos

PC: Periodo de Carencia

---: No tiene

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular de Registro, garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con la descripción indicada en la etiqueta y es apto para su uso siguiendo las instrucciones dadas.



**MANTENGA ALEJADO DE LAS PERSONAS, ANIMALES, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MEDICINALES.**

**LIGERAMENTE TÓXICO PRECAUCIÓN**

**DESTRUYA ESTE ENVASE INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO.**

