**TRICOX®** es un fungicida - nematicida biológico derivado de la fermentación de microorganismos del género Trichoderma spp. Sus ingredientes incluyen organismos vivos, complejos enzimáticos y nutrientes, los cuales benefician el crecimiento vegetal.
**TRICOX®** es recomendado para todo tipo de cultivos; ya que estimula el crecimiento radicular, promueve el crecimiento y desarrollo vegetal, promueve la floración y mejora la productividad y calidad de los cultivos.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**
Este producto es ligeramente toxico, tener en cuenta las siguientes medidas de precaución:
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar, ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas, ni forrajes.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación; y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Almacenar el producto en lugares frescos y bien ventilados.
- Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**
El producto es considerado inocuo pero en caso de ingestión accidental, llamar al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante 15 minutos, y si el contacto fuese con la piel, retirar la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- **Antídoto: No requiere.**

**TOXICOLOGÍA**
Ligeramente tóxico
DI50 oral: > 5000 mg/kg

**Teléfonos de Emergencia:**
**CICOTOX: 0-800-1-3040 ó 328 7398**
**ESSALUD: 0801-10200 ó 411 8000 (opción 4)**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Los envases una vez usados deben ser acumular en sitios especiales para ello, no arrojar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

ECONOMÍA SEGURIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE

**MANTENGA ALEJADO DE LAS PERSONAS, ANIMALES, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MEDICINALES.**

# Tricox®
(Trichoderma)

**Fungicida - Nematicida Biologico - Polvo Mojable (WP)**

**FUNGICIDA - NEMATICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA**

**Composición Química:**

| | |
|---|---|
| *Trichoderma koningii* | 3 x $10^7$ conidias/g |
| *Trichoderma harzianum* | 2 x $10^7$ conidias/g |
| Magnesio | 5 x $10^3$ g/g |
| Manganeso | 1 x $10^3$ g/g |
| Zinc | 1 x $10^3$ g/g |

**Registro PBUA Nº 162 SENASA**

**Titular de Registro:** **SILVESTRE PERÚ S.A.C.**
Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú
Tel.: (01) 617-3300 Fax: (01) 617-3312
Correo electrónico: sec@grupositvestre.com.pe

**Formulado y Envasado por:** **JH BIOTECH, INC.**
4951 Olivas Park Drive Ventura, CA 93003 - USA.
Tel.: (805) 650 - 8933 Fax.: (805) 650 - 8942

**Importado y Distribuido por:** **SILVESTRE PERÚ S.A.C.**

Contenido Neto: **1 Kg**
F. de Form:
Nº Lote:
F. de Venc:

Silvestre Protección Vegetal

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE TÓXICO**
**PRECAUCIÓN**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**
Puede ser aplicado con cualquier equipo de aplicación dirigida al cuello de planta o por el sistema de riego por goteo.

**Cuadro de dosificaciones:**

| CULTIVO | PLAGA | | DOSIS (Kg/ha) | MOMENTO DE APLICACIÓN | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO | | | | |
| **PALTO** | Brazo negro | *Lasiodiplodia teobromae* | 2 | Antes que se presente la enfermedad | --- | --- |
| **GRANADO** | Nematodo del nudo | *Meloidogyne incognita* | 2.0 | Antes que se presente la enfermedad. | --- | --- |
| **VID** | "Hielo azul" | *Phytophthora capsici* | 1 - 2 | Iniciar la aplicación en las primeras etapas fenológicas del cultivo o previa evaluación al inicio de la infestación de la plaga. | --- | --- |
| **MANDARINA** | "Gomosis del cuello" | *Phythopthora nicotianae* | 2 | Antes que se presente la enfermedad | --- | --- |
| **CAFE** | "Roya del cafe" | *Hemileia vastatrix* | 1.0 | Iniciar la aplicación en las primeras etapas frenológicas del cultivo | --- | --- |

**LMR:** Límite Máximo Residuos **PC:** Período de Carencia **---:** No tiene

**SISTEMA DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN**
**TRICOX®** se emplea diluido en agua. Preparar una pre-mezcla, diluyendo la cantidad necesaria del producto en un balde, luego vaciar al recipiente definitivo y completar la cantidad de agua. Si es posible, dejar la solución reposando entre 5 a 6 horas antes de la aplicación. Esto ayudará a aumentar la activación del producto. Si es necesario agitar la solución durante la aplicación.
Se recomienda por lo menos dos aplicaciones por campaña para cultivos anuales y perennes.
Se recomienda realizar la aplicación al inicio del desarrollo del cultivo.

**COMPATIBILIDAD**
**TRICOX®** es compatible con la mayoría de fungicidas, excepto los benzimidazoles como el benomil y carbendazim. Es incompatible con materiales fuertemente oxidantes, alcalinos y/o ácidos.

**FITOTOXICIDAD**
No es fitotóxico para los cultivos recomendados.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**
El Titular de Registro, garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con la descripción indicada en la etiqueta y es apto para su uso siguiendo las instrucciones dadas.

**DESTRUYA ESTE ENVASE INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO.**