

TRICOX® es un fungicida - nematocida biológico derivado de la fermentación de microorganismos del género Trichoderma spp. Sus ingredientes incluyen organismos vivos, complejos enzimáticos y nutrientes, los cuales benefician el crecimiento vegetal. **TRICOX®** es recomendado para todo tipo de cultivos; ya que estimula el crecimiento radicular, promueve el crecimiento y desarrollo vegetal, promueve la floración y mejora la productividad y calidad de los cultivos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Este producto es ligeramente tóxico, tener en cuenta las siguientes medidas de precaución:

- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar, ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas, ni forrajes.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación; y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Almacenar el producto en lugares frescos y bien ventilados.
- Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

El producto es considerado inocuo pero en caso de ingestión accidental, llamar al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.

- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante 15 minutos, y si el contacto fuese con la piel, retirar la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- **Antídoto: No requiere.**

TOXICOLOGÍA

Ligeramente tóxico
D150 oral: > 5000 mg/kg

Teléfonos de Emergencia:
CICOTOX: 0-800-1-3040 ó 328 7398
ESSALUD: 0801-10200 ó 411 8000 (opción 4)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin



Fungicida - Nematicida Biológico - Polvo Mojable (WP)

FUNGICIDA - NEMATICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA

Composición Química:

Trichoderma koningii 3 x 10⁷ conidias/g
Trichoderma harzianum 2 x 10⁷ conidias/g
Magnesio 5 x 10⁻³ g/g
Manganeso 1 x 10⁻³ g/g
Zinc 1 x 10⁻³ g/g

Registro PBUA N° 162 SENASA

Titular de Registro: SILVESTRE PERÚ S.A.C.
Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú
Tel.: (01) 617-3300 Fax: (01) 617-3312
Correo electrónico: sec@grupossilvestre.com.pe

Formulado y Envasado por: JH BIOTECH, INC.
4951 Olivas Park Drive Ventura, CA 93003 - USA.
Tel.: (805) 650 - 8933 Fax.: (805) 650 - 8942

Importado y Distribuido por: SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Contenido Neto: **1 Kg**
F. de Form:
N° Lote:
F. de Venc:



NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE TÓXICO PRECAUCIÓN

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Puede ser aplicado con cualquier equipo de aplicación dirigida al cuello de planta o por el sistema de riego por goteo.

Cuadro de dosificaciones:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (Kg/ha)	MOMENTO DE APLICACIÓN	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO				
ALCACHOFA	“Nematodo del nudo”	Meloidogyne incognita	1.5 - 2.75	Iniciar la aplicación 15 días después del trasplante y una segunda aplicación, 30 días después de la primera.	---	---
PALTO	“Brazo negro”	Lasiodiplodia thebromae	2.0	Antes que se presente la enfermedad.	---	---
PIMIENTO	“Hielo azul”	Phytophthora capsici	1 - 2	Iniciar la aplicación en las primeras etapas fenológicas del cultivo o previa evaluación al inicio de la infestación de la plaga.	---	---
VID	“Oidium”	Erysiphe necator	1.5 - 2.0	Fructificación	---	---
CAFE	“Roya del cafe”	Henileia vastatrix	1.0	Antes que se presente la enfermedad	---	---
ARANDANO	“Brazo negro”	Lasiodiplodia teobromae	1.5	Antes que se presente la enfermedad	---	---

LMR: Límite Máximo Residuos PC: Período de Carencia ---: No tiene

SISTEMA DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

TRICOX® se emplea diluido en agua. Preparar una pre-mezcla, diluyendo la cantidad necesaria del producto en un balde, luego vaciar al recipiente definitivo y completar la cantidad de agua. Si es posible, dejar la solución reposando entre 5 a 6 horas antes de la aplicación. Esto ayudará a aumentar la activación del producto. Si es necesario agitar la solución durante la aplicación. Se recomienda por lo menos dos aplicaciones por campaña para cultivos anuales y perennes. Se recomienda realizar la aplicación al inicio del desarrollo del cultivo.

COMPATIBILIDAD

TRICOX® es compatible con la mayoría de fungicidas, excepto los benzimidazoles como el benomil y carbendazim. Es incompatible con materiales fuertemente oxidantes, alcalinos y/o ácidos.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico para los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro, garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con la descripción indicada en la etiqueta y es apto para su uso siguiendo las instrucciones dadas.

MANTENGA ALEJADO DE LAS PERSONAS, ANIMALES, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MEDICINALES.



DESTRUYA ESTE ENVASE INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO.

