24 cm

34 cm

31 cm

CAPATAZ®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

Composición Química:

Mancozeb..... 640 g/kg
Cymoxanil..... 80 g/kg
Aditivos..... csp 1 kg

Reg. PQUA Nº 497 - SENASA

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:

AGRO KLINGE S.A.
Calle René Descartes N° 311,
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima-Perú.
Telf.: 612-6565
R.U.C N° 20508704217

Fabricado y Formulado por:
Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd
6TH Floor, Gaoxinjishuchuangye Centre,
Shunhua Road 750#,
Jinan, Shandong, China

N° Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto: 1 Kg

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

1 cm

1 cm

1 cm

Pantone 293 C Pantone 7483 C Reflex blue C Pantone 7421 C

24 cm

34 cm

31 cm

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Cuidado evite el contacto. PROBABLE CARCINÓGENO.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado; en lugares secos y ventilados, lejos del calor.
- Almacenar el producto en un lugar fresco, seco y ventilado. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No comer beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Acetamida + Dithiocarbamato.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele una copia de esta etiqueta.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de ingestión no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos.

En caso de **emergencia toxicológica** llamar a **CICOTOX: 080013040, ALO ESSALUD: 472-2800**

ATENCIÓN AL CLIENTE: AGRO KLINGE S.A.: (01) 612-6565.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Los envases, una vez usados se deben acumular en sitios especiales para ello, no botar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos.

MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de aplicación de no aplicación hacía cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: CAPATAZ es un fungicida de contacto y sistémico, con acción preventiva y curativa para el control de enfermedades producidas por patógenos de la orden peronosporales, tales como la "Rancha".

SISTEMA Y FORMA DE APLICACIÓN: CAPATAZ se aplica en pulverizaciones foliares, previa mezcla con agua con equipos de aspersión terrestre.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DOSIS Y USOS.

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R (ppm)	
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/ha	kg/cil. 200 L		Mancozeb	Cymoxanil
PAPA	"Rancha"	*Phytophthora infestans*	1-2	0,5-1	14	0,3	0,05

P.C.= Período de carencia / L.M.R.= Límite máximo de residuos

VOLUMEN DE GASTO DE AGUA: 400 a 600 L/ha

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Iniciar las aplicaciones cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad. El intervalo de aplicación varía entre 7 a 14 días.

NÚMERO DE APLICACIONES:
2 aplicaciones/campaña/año.

PERIODO DE REINGRESO: No ingresar al área tratada antes de las 24 horas.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos indicados a las dosis recomendadas.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con los plaguicidas de reacción alcalina y los compuestos a base de cobre. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas."

® Marca Registrada por *Tecnología Química y Comercio S.A.*

1 cm

1 cm

1 cm

Pantone 293 C Pantone 7483 C Reflex blue C Pantone 7421 C