

11 cm

11 cm

# METRALLA®

## INSECTICIDA AGRÍCOLA

### POLVO MOJABLE (WP)

#### COMPOSICIÓN:

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Diflubenzuron      | 250 g/Kg |
| Lambda cyhalothrin | 100 g/Kg |
| Aditivos           | csp 1Kg  |

### PQUA N° 352 - SENASA

## INTEROC @ CUSTER

**Titular de Registro,  
Importador y Distribuidor:**  
**INTEROC S.A.**  
Av. Santa Cruz 875  
Oficina 300 - Miraflores  
Telf.: (511) 614-5100  
Lima - Perú



SINOCHEN NINGBO LTD.

**Formulador:**  
**SINOCHEN NINGBO  
CHEMICALS CO., LTD**  
21 Jiangxia St.  
Ningbo Province, China  
(86) 574 87348868

Fecha de Formulación :  
N° de Lote :  
Contenido Neto : **100 g**  
Fecha de Vencimiento :

### NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO



### MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

#### "LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**  
"Peligroso si es inhalado". Evite respirar el polvo o la aspersión. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No almacenar junto con alimentos, bebidas o semillas para el consumo humano o animal. Causa irritación moderada a los ojos. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

**PRIMEROS AUXILIOS:**  
Grupos Químicos: Diflubenzuron (Benzoylurea) y Lambda-cyhalothrin (Piretroide).  
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.  
En caso de contacto con la piel, lavar la zona afectada con abundante agua y jabón.  
En caso de contacto con los ojos, debe proceder a lavarlos con grandes cantidades de solución acuosa salina isotónica.  
En caso de inhalación, trasladar a la víctima a un lugar fresco.  
En caso de ingestión, no inducir al vómito si la persona está inconsciente. Solicitar atención médica.  
El tratamiento debe ser sintomático, no se conoce antídoto específico.

**TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS**  
**CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita)**  
Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614-5100

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**  
Después de usar el contenido enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. No emplear el envase para ningún otro fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**  
"Peligroso para organismos acuáticos". No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Respetar una banda de aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.  
Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos.  
Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.  
No permitir animales en el área tratada.  
En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.  
El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**  
Insecticida a base de Diflubenzuron y Lambda-cyhalothrin. Calcule la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que pretende proteger. Ponga en el tanque de mezcla la mitad del agua que se vaya a emplear, adicione la cantidad de producto de acuerdo a la dosis recomendada y agite. Adicione el resto de agua. El producto es aplicado en forma terrestre.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**  
Para las plagas recomendadas en maíz y tomate realizar 2 aplicaciones por campaña/año. Para plagas recomendadas en arroz, algodón y espárrago, realizar 1 aplicación de **METRALLA®** considerando un máximo de 1 campaña/año.  
El momento de aplicación se realizará cuando se presenten los estadios iniciales de la plaga.

**PERIODO DE REINGRESO:** 24 horas luego de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:**  
**METRALLA®** es compatible con otros insecticidas y plaguicidas (excepto productos alcalinos). Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de realizar las mezclas.

**FITOTOXICIDAD:**  
No es fitotóxico a la dosis recomendada.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**  
"El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. El Titular de Registro no se responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del agricultor".

#### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| CULTIVO                                       | PLAGA                                    |                              | DOSIS<br>(g/cil de 200 L) | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm)                               |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------------------------|
|                                               | NOMBRE COMÚN                             | NOMBRE CIENTÍFICO            |                           |              |                                            |
| Maíz<br>( <i>Zea mays</i> )                   | "Gusano cogollero"                       | <i>Spodoptera frugiperda</i> | 200 - 250                 | 21           | 0.05 <sup>(1)</sup><br>0.05 <sup>(2)</sup> |
| Arroz<br>( <i>Oryza sativa</i> )              | "Gusano cogollero"                       | <i>Spodoptera frugiperda</i> | 200                       | 21           | 0.05 <sup>(1)</sup><br>1 <sup>(2)</sup>    |
| Espárrago<br>( <i>Asparagus officinalis</i> ) | "Caballada (gusano ejército)"            | <i>Spodoptera eridania</i>   | 200 - 250                 | 5            | 0.05 <sup>(1)</sup><br>0.02 <sup>(2)</sup> |
|                                               | "Gusano perforador grande de la bellota" | <i>Heliothis virescens</i>   |                           |              |                                            |
| Algodón<br>( <i>Gossypium barbadense</i> )    | "Gusano perforador grande de la bellota" | <i>Heliothis virescens</i>   | 200 - 250                 | 21           | 0.05 <sup>(1)</sup><br>0.2 <sup>(2)</sup>  |
| Tomate<br>( <i>Lycopersicon esculentum</i> )  | "Caballada (gusano ejército)"            | <i>Spodoptera eridania</i>   | 200 - 250                 | 15           | 0.05 <sup>(1)</sup><br>0.1 <sup>(2)</sup>  |
| Pimiento<br>( <i>Capsicum annuum</i> )        | "Caballada (gusano ejército)"            | <i>Spodoptera eridania</i>   | 250                       | 7            | 1 <sup>(1)</sup><br>0.1 <sup>(2)</sup>     |

PC: Periodo de Carenia

(1) Diflubenzuron, (2) Lambda cyhalothrin

LMR: Límite Máximo de Residuos



17 cm

2.55 cm