

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES, MANIPULEO, ALMACENAJE Y TRANSPORTE

- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Utilizar mascarilla de protección durante la preparación de la solución

PRIMEROS AUXILIOS

- *Bacillus thuringiensis var. kurstaki* es considerado como inocuo (no tóxico), pero en caso de ingestión accidental se puede proceder a inducir al vómito y consultar al médico.

- DL 50 del producto formulado:

Aguda oral > 5 050 mg/kg
Aguda dermal > 2 020 mg/kg

Teléfonos de emergencia: CICOTOX 0800-1-3040
CISPROQUIM 0800-50847

ANTÍDOTO

No hay antídoto

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

USOS Y DOSIFICACIONES RECOMENDADAS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		U.A.C (Días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	g/cil de 200L	Kg/ Ha		
Alcachofa	Gusano defoliador	<i>Spodoptera eridania</i>	300-400		-	-
Esparrago	Gusano del ejercito	<i>Spodoptera frugiperda</i>		1.5*	-	-
Paprika	Perforador de frutos	<i>Heliothis virescens</i>	300			

*El volumen de agua recomendado es de 600 Lt/Ha

U.A.C.: Última aplicación antes de la cosecha

LMR: Límites máximos de residuos

MANTENGASE ALEJADO DE LAS
PERSONAS, ANIMALES,
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y
MEDICINAS



DESTRUYA EL ENVASE
INMEDIATAMENTE
DESPUES DE USAR EL
PRODUCTO

INDICATIVOS DE USO

Veritox 6.4%PM es un insecticida biológico producido por la esporulación de la bacteria *Bacillus thuringiensis var. kurstaki*. Actúa por ingestión, su acción es letal para larvas de lepidópteros en diferentes cultivos.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Para su adecuada aplicación, llenar hasta la mitad el tanque de aplicación, luego aplicar el producto a la dosis recomendada, completar con agua, agitar y aplicar.

Frecuencia y época de aplicación

Veritox 6.4%PM se debe aplicar con los primeros síntomas de infestación, larvas de 1er o 2do estadio asegurándose una cobertura total. Se puede aplicar en cualquier momento incluso el día de la cosecha.

Compatibilidad. - **Veritox 6.4%PM** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina.

Responsabilidad civil. - El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

Veritox^{6.4% WP}

(*Bacillus thuringiensis var. kurstaki*)

INSECTICIDA BIOLÓGICO

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Ingrediente activo:

Bacillus thuringiensis var. kurstakicontiene 32000 IU/mg(6.4 %)

Ingredientes inertes..... 93.6 %

Reg.PBUA N° 217 - SENASA

INSECTICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA

Titular del Registro, Importado y Distribuido por:

Insumos Agrícolas Peruanos S.A.C.
Av. Nicolás Arriola N° 1457 ofc. 202
Urb Apolo - La Victoria
Lima - Perú.
Tel.: (01) 663-38-43

Fabricado y Formulado por :

Shanghai Vegcides Bio-Farm (Nanchang) Co. Ltd.
55Hu Bin Road, Nanchang Jiangxi - China
Telf: 0791 - 8153000

CONTENIDO NETO: 250 gr.

Lote No.:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO EXPLOSIVO - NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO

LIGERAMENTE TOXICO - PRECAUCIÓN