



Rhodax®

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable (WP)

Fosetil AI, 350 g/kg
Mancozeb, 350 g/kg
Aditivos, 300 g/kg

Reg. PQUA N°

Titular del Registro:

Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
Piso 10. San isidro.

Formulado por:
Bayer CropScience
A.A 80004
Bogotá D.C.- Colombia

Importado y distribuido por:
Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
San Isidro. Lima-Perú
Telf: 2113800

**¡NO EXPLOSIVO! ¡NO INFLAMABLE!
¡NO CORROSIVO!**

**Contenido
Neto: 1 kg**

Lote N°
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

® = Marca Registrada de Bayer AG/Alemania

LIGERAMENTE PELIGROSO

CUIDADO

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Antes de usar el producto lea cuidadosamente esta etiqueta y siga sus instrucciones.
 Durante el manejo del producto, no comer, beber ni fumar.
 Evite su contacto con la piel y prolongada inhalación.
 Use guantes y máscaras protectoras.
 Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
 No se debe ingerir.
 Terminadas las labores, deben lavarse con abundante agua y jabón las partes del cuerpo expuestas al producto y cambiarse de ropa.
 No trate de desatorar los equipos soplando con la boca.
 No transporte ni almacene este producto junto a comestibles, bebidas o medicinas de uso humano.
 Evítese la contaminación de alimentos y medicinas para uso humano y animal, así como semillas, forrajes, fertilizantes, implementos agrícolas.
 En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.
 Almacenar en lugar ventilado separado de productos inflamables.
 Señalizar el área de almacenamiento.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Ditiocarbamatos - Mancozeb
 Organofosforado - Fosetyl Aluminio
 En caso de ingestión inducir al vómito, solo si el paciente está conciente y no convulsiona. Buscar ayuda médica.
 En caso de contacto con la piel remover la ropa contaminada y lavar las áreas afectadas con agua y jabón. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usarla.
 En caso de inhalación remover al paciente al aire fresco. Si no respira dar respiración artificial. Administrar oxígeno si es necesario. Buscar ayuda médica.
 En caso de contacto con los ojos lavar inmediatamente con abundante agua corriente por lo menos durante 15 minutos con los párpados abiertos. Buscar ayuda médica.

ANTÍDOTO: No tiene antídoto específico.

NOTA AL MÉDICO:

Se recomienda hacer un lavado gástrico el que debe practicarse con protección de las vías respiratorias para prevenir la aspiración bronquial.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN:

CICOTOX: 0800-1-3040 CISPQUIM: 0800-50847 ESSALUD: 0801-10200

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, destruya el envase y déjelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Peligroso para organismos acuáticos.
 No contaminar ríos, estanques u arroyos con los desechos o envases vacíos.
 No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
 Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
 Peligroso para animales domésticos fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
 El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
 En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

RHODAX es un fungicida de contacto y sistémico para el control de "mildiu" y "rancha" en los cultivos de ajo, cebolla, papa, tomate, sandía y zapallo.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Rhodax se prepara diluyendo la dosis en un volumen reducido de agua y luego se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido. Proceder a su aplicación con cualquier equipo de aplicación terrestre.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN:

Se recomienda como máximo una aplicación del producto por campaña año, cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad o en forma preventiva

PERIODO DE REINGRESO: 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

RHODAX es incompatible con cualquier producto fuertemente básico (Alcalino) también es incompatible con fertilizantes foliares, composición aceitosa y formulaciones de cobre.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico con los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

USO ESPECÍFICO:

CULTIVOS	ENFERMEDADES		DOSIS			PC* (días)	LMR** (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE TÉCNICO	%	kg / cil	kg / ha		
CEBOLLA AJO	Mildiu	<i>Peronospora destructor</i>	0.3 - 0.4	0.6 - 0.8	1.2 - 1.6	15	Mancozeb: 0.5 Fosetyl Al: 0.5
PAPA	Hielo o Ranca	<i>Phytophthora infestans</i>	0.5 - 0.6	1.0 - 1.2	2.0 - 2.4	14	Mancozeb: 0.3 Fosetyl Al: 30
TOMATE	Hielo o Ranca	<i>Phytophthora infestans</i>	0.5 - 0.6	1.0 - 1.2	2.0 - 2.4	7	Mancozeb: 2 Fosetyl Al: 15
SANDÍA	Mildiu	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	0.4 - 0.5	0.8 - 1.0	1.6 - 2.0	7	Mancozeb: 1 Fosetyl Al: 15
ZAPALLO	Mildiu	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	0.4 - 0.5	0.8 - 1.0	1.6 - 2.0	7	Mancozeb: 0.2 Fosetyl Al: 15

* PC=Periodo de carencia (en días)

**LMR=Límite máximo de residuos (en ppm)

