

35 cm

55 cm

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original. Etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar junto a alimentos, bebidas o medicinas tanto de uso humano como animal.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca, si el contacto fuese con la piel, lavarse con agua y jabón.
En caso de ingestión accidental inducir vomito y no suministrar nada.

RECOMENDACIÓN AL MÉDICO:

Tratar sintomáticamente. No tiene antídoto específico.

TELEFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACION
Emergencia CICOTOX Tel.: 0800-3040

MANEJO DE ENVASES VACIOS

Después de usar el producto enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego “inutilícelo”, “triturándolo” o “perforándolo” y deposítelo en los lugares destinados por las autoridades para este fin.

MEDIDAS PARA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

- Peligroso para las abejas y artrópodos benéficos.
- Peligroso para peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o acequias con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes con agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- No aplicar en los suelos con Napa Freática superficial.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- Inutilice los envases vacíos perforándolos y lavándolos por 3 veces.
- Utilizar el agua del lavado sobre el cultivo que se está aplicando.

DANTOTSU® 50 WG

INSECTICIDA AGRICOLA

GRANULOS DISPERSABLES (WG)

Composición Química:

Clothianidin 500 g/Kg
Aditivos 500 g/Kg

Reg. PQUA N° 081-SENASA

CONTENIDO NETO: 40 Kg

Lote N°:
Fecha de Fab:
Fecha de Exp:

TITULAR DEL REGISTRO:



ARYSTA LIFESCIENCE PERU S.A.
Av. Arenales 395 Oficina 603
Tel.: 332-6633

FABRICANTE:

Sumitomo Chemical Co., Ltd.
27-1, Shinkawa 2-Chome, Chuo-Ku,
Tokio 104-8260, Japan
Tel: 81-3-5543-5731
Fax: 81-3-5543-5932

IMPORTADOR - DISTRIBUIDOR:



The Chemical Company

Av. Oscar R. Benavides 5915, Callao 1.
Casilla 3911, Lima 100.
Telf.: (01) 513 2500
Fax : (01) 513 2517 (01) 513 2518

NO EXPLOSIVO NO INFLAMABLE NO CORROSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Dantotsu® 50 WG es un insecticida del grupo químico de Cloronicotinilo con acción sistémica que controla los insectos por contacto e ingestión afectando el sistema nervioso de los insectos actuando sobre la transmisión del impulso nervioso a nivel de la membrana postsináptica en forma similar a la acetilcolina.

PREPARACION DE LA MEZCLA

Poner la dosis recomendada en 4 litros de agua, luego verter la mezcla en el equipo de aplicación y completar con agua.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO”

CUADRO DE USO

Cultivo	Enfermedad		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre Técnico	g/ha	g/200 L		
Espárrago	“Prodiplosis”	<i>Prodiplosis longifila</i>	400	160	30	0.02
Mandarina	“Minador de hoja”	<i>Phyllocnistis citrella</i>	0.03 - 0.05 %	60 - 100	14	2
Papa	“Mosca minadora”	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	140 - 280	40 - 60	14	0.05
Tomate	“Mosca blanca”	<i>Bemisia tabaci</i>	100 - 140	40 - 60	14	2.0
	“Mosquilla de los brotes”	<i>Prodiplosis longifila</i>	300 - 400*	-	7	0.2

PC = Período de carencia.
LMR = Límite Máximo de Residuos.
* El volumen de agua recomendado es de 450 L/Ha.
En cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país destino.

MOMENTOS DE APLICACIÓN

Efectuar un máximo, de 2 aplicaciones por campaña rotándolo con producto de otro grupo químico. Se sugiere la separación mínima entre aplicaciones de 10 a 14 días.
En espárrago, las aplicaciones deberán efectuarse en fase de crecimiento, nunca sobre cosecha.

FRECUENCIA Y PERIODO DE APLICACIÓN:

Dantotsu® 50 WG es recomendable aplicarlo al inicio de la infestación, debido a su larga residualidad mantiene protegido al cultivo entre los 14 días.

COMPATIBILIDAD Y ROTACION DE PRODUCTOS

Dantotsu® 50 WG es compatible con insecticidas y fungicidas de otros grupos químicos. Se recomienda rotar a las aplicaciones de Dantotsu® 50 WG con productos químicos de otros grupos para evitar resistencia y mantener su eficacia.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



Pantone azul 293 C

Pantone azul 281 C

Pantone verde 389 C

Negro