

PROYECTO DE ETIQUETA – PROPINEB x 1 Kg

ANTRANEB

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

Composición Química:

Propineb.....700 g/kg
Aditivos.....c.s.p..... 1.0 kg

Reg. PQUA N° 505-SENASA

Titular del Registro:
FARMEX S.A.

Fabricado y Formulado por:

BIESTERFELD SHANGHAI CO. LTD

Dirección: Unit 906-07, Harbour Ring Plaza, 18 Xi Zang Road (M),
Shanghai 200001, China.

Teléfono: (86)-21-53852290/53852297



Importado y Distribuido por:

FARMEX S.A.

Calle Dean Valdivia 148, Piso 7, San Isidro, Lima.

Teléfono: 630-6400, Fax: 630-6410.

Contenido Neto : 1 Kilogramo

N° de Lote :

Fecha de Fabricación :

Fecha de Vencimiento :

**NO
CORROSIVO**

**NO
INFLAMABLE**

**NO
EXPLOSIVO**

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El contacto prolongado o repetitivo con este producto puede causar reacciones alérgicas a ciertas personas.
 - Este producto puede ser nocivo si se ingiere accidentalmente. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
 - Conservar este producto en su envase original, bien tapado, etiquetado.
 - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
 - No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
 - Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
 - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
 - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
 - Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.
- PRIMEROS AUXILIOS:** Grupo químico: Ditiocarbamato.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
 - En caso de ingestión accidental, mantener al paciente en reposo. Lavar la boca con agua, no inducir el vómito, ni dar de beber a un paciente inconciente.
 - En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
 - En caso de inhalación, trasladar al paciente hacia el aire fresco y mantenerlo en reposo.
 - No hay antídoto específico. Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

**Central de Urgencias y Emergencias de EsSalud: 117 (línea gratuita),
CICOTOX 0800-13040 (línea gratuita)**

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, y luego inutilícelo cortándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

GENERALIDADES

ANTRANEB es un fungicida de contacto ineventivo, se absorbe fácilmente a través de las hojas de la planta, impide el desarrollo del patógeno interfiriendo en el desarrollo del micelio y de la esporulación.

PREPARACION Y APLICACION

Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado. Aplicar en pulverización empleando cualquier equipo de aplicación terrestre.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USO

Cultivo	Enfermedad		Dosis (g/cil.)	Dosis/Ha. (g/Ha.)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico				
Espárrago	Mancha púrpura	<i>Stemphylium vesicarium</i>	600-700	1200-1400	28	0.05

*P.C.: Período de carencia en días. L.M.R.: Límite máximo de residuos en partes por millón.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN. No realizar más de 2 aplicaciones por campaña. El intervalo de aplicación es mínimo 15 días.

PERIODO DE REINGRESO. No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 12 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este período.

COMPATIBILIDAD. Es compatible con la mayoría de los plaguicidas comúnmente usados a excepción de los de reacción muy alcalina (pH > 9) y de los fertilizantes foliares. Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre los productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

FITOTOXICIDAD. ANTRANEB no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL. El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

