

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

# ANTRANEB

## FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE – WP

### COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Propineb ..... 700 g/kg  
Aditivos..... c.s.p..... 1 kg

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El contacto prolongado o repetitivo con este producto puede causar reacciones alérgicas a ciertas personas.
- Este producto puede ser nocivo si se ingiere accidentalmente. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar este producto en su envase original, bien tapado, etiquetado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.

#### PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Ditiocarbamato.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión accidental, mantener al paciente en reposo. Lavar la boca con agua, no inducir el vómito, ni dar de beber a un paciente inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, trasladar al paciente hacia el aire fresco y mantenerlo en reposo.
- No hay antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- Teléfonos de emergencia: Central de Urgencias y Emergencias de EsSalud: 117 (línea gratuita), CICOTOX 0800-13040 (línea gratuita), FARMEX S.A. (01) 630-6400.**

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**ANTRANEB** es un fungicida de contacto preventivo, se absorbe fácilmente a través de las hojas de la planta, impide el desarrollo del patógeno interfiriendo en el desarrollo del micelio y de la esporulación.

Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado. Aplicar con cualquier producto de aplicación terrestre.

| Cultivo   | Enfermedad       |                                | Dosis     |           | PC (días) | LMR (ppm) |
|-----------|------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|           | Nombre común     | Nombre científico              | Kg/cil    | Kg/Ha     |           |           |
| Arroz     | Quemado          | <i>Pyricularia oryzae</i>      | ---       | 2.0       | 7         | 0.05      |
|           | Mancha carmelita | <i>Helminthosporium oryzae</i> |           |           |           |           |
| Cebolla   | Mildiu           | <i>Peronospora destructor</i>  | 0.75-1    | ---       | 7         | 0.05      |
| Espárrago | Mancha púrpura   | <i>Stemphylium vesicarium</i>  | 0.6 – 0.7 | 1.2 – 1.4 | 28        | 0.05      |
| Papa      | Rancha           | <i>Phytophthora infestans</i>  | 0.75      | ---       | 15        | 0.2       |

#### FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

No realizar más de 2 aplicaciones por campaña. El intervalo de aplicación es mínimo 15 días.

#### PERIODO DE REINGRESO

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 12 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este período.

#### COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los plaguicidas comúnmente usados a excepción de los de reacción muy alcalina (pH > 9) y de los fertilizantes foliares. Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre los productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

#### FITOTOXICIDAD

**ANTRANEB** no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Reg. PQUA N° 505-SENASA

Contenido neto: 25 kilogramos

Titular del Registro: FARMEX S.A.



Importado y distribuido por:

**FARMEX S.A.**

Calle Dean Valdivia 148, Piso 7

San Isidro, Lima 27 - PERU.

Teléfono: (01) 630-6400, Fax: (01) 630-6410

Lote N°:

F. Fab.:

F. Venc.:

Fabricado y Formulado por:

**SABERO ORGANICS GUJARAT LTD.**

A-302, Phoenix House, 3rd Floor, 462

Senapati Bapat Marg, Worli (E)

Mumbai 400 013 - India

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

