


“LEA LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE
USAR EL PRODUCTO”

Nombre comercial del producto: PRECISION® 100 EC
Nombre químico: (S)-α- cyano-3-phenoxybenzyl (1R, 3R)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate y (R)-α- cyano-3-phenoxybenzyl (1S, 3S)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
Nombre común: ALFA-CYPERMETHRIN
Clase: INSECTICIDA AGRÍCOLA
Registro PQUA N° 507 - SENASA
Composición:
Alpha-cypermethrin..... 100 g/L
Naphta..... 800 g/L
Aditivos..... c.s.p. 1 L
Fórmula empírica: C₂₂H₁₉Cl₂O₃N
Peso molecular: 416,3
Fórmula estructural:



PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL PRODUCTO FORMULADO
• Apariencia: Líquido
• Color: Ligeramente amarillo
• Olor: Tenue olor aromático
• Almacenamiento: **PRECISION® 100 EC** conserva sus características físicas y de composición bajo condiciones de almacenamiento a temperatura ambiente y en su envase original y sellado.

NO CORROSIVO **NO EXPLOSIVO**
NO INFLAMABLE

INFORMACIÓN RELATIVA A LA SEGURIDAD
• **LEA LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.**
• **MANTENER BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**
• Este producto es tóxico si se ingiere o es inhalado. Evite el contacto con la piel y ojos.
• Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
• No reenvasar o depositar el contenido en otros envases. Asegurar un buen almacenamiento con humedad y temperaturas controladas, alturas de arrumes y con buena ventilación.
• No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
• No almacenar en casas de habitación.
• Lavar los equipos de aplicación después de su uso.
• No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

• Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
• Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento y no aplicar a velocidad de viento mayor a 10km/h.
• No aplicar a una temperatura mayor a 30°C ni a una humedad relativa menor a 50%.
• Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
• Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
• Evitar los riesgos de toxicidad.

PRIMEROS AUXILIOS
• **Grupo químico: Piretroide**
• En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta y la Hoja Informativa Adjunta.
• En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
• En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
• En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
• En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
• Antídoto: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: 328-7700
ESSALUD: 411-8000 (opción 4)
CISPROQUIM: 0800-50847



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
• Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
• Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
• Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
• Peligroso para las abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
• Nocivo para la fauna benéfica.
• Nocivo para el ganado. Manténganlo fuera de las zonas tratadas, al menos durante 1 día después de la aplicación.
• Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. Tóxico para organismos acuáticos.
• Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
• Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
• Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
• El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
• No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
• En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN
PRECISION® 100 EC es un insecticida que actúa por contacto e ingestión, empleado en el control de la plagas recomendadas en esta etiqueta.

MÉTODO DE APLICACIÓN
PRECISION® 100 EC se emplea diluido en agua; preparar una pre-mezcla con la dosis recomendada, en un tercio del volumen a utilizar. Agitar bien y completar el volumen de agua hasta lograr una mezcla homogénea .

EQUIPO DE APLICACIÓN
PRECISION® 100 EC puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, por parihuelas, etc.). Antes de iniciar la aplicación, asegurarse que el equipo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y correctamente calibrado.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Realizar como máximo una aplicación de **PRECISION® 100 EC** por campaña/año. Aplicar cuando se observen las primeras posturas y/o larvas, durante el crecimiento vegetativo

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cuadro de usos:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	ml/200L	ml/ha		
ALCACHOFA	Gusano perforador	<i>Heliothis virescens</i>	200	-	7	0.1
ALGODÓN	Gusano perforador de la bellota	<i>Heliothis virescens</i>	100	100	14	0.2
ESPÁRRAGO	Gusano perforador	<i>Heliothis virescens</i>	250	-	3	0.1
MANDARINA	Perforador de los frutos	<i>Argyrotaenia sphaleropa</i>	150-200	-	1	2
PALTO	Gusano del cesto	<i>Oiketicus kirbyi</i>	150-250	-	7	0.05

P.C.: Periodo de carencia L.M.R.: Límite Máximo de Residuos

PERIODO DE REINGRESO
Puede reingresar al campo 48 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

COMPATIBILIDAD
PRECISION® 100 EC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con aguas carbonatadas, agentes oxidantes o productos de reacción alcalina. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD
PRECISION® 100 EC no es fitotóxico en los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta.

EFFECTO SOBRE OTROS CULTIVOS
No tiene efecto sobre otros cultivos.

EFFECTOS SOBRE CULTIVOS SUCESIVOS Y/O SUSCEPTIBLES
No se han reportado efectos sobre otros cultivos ni susceptibilidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

PRECISION® 100 EC
PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
INSECTICIDA AGRÍCOLA
Concentrado Emulsionable (EC)



Titular del Registro:
SILVESTRE PERÚ S.A.C.
Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.
Tel.: (01) 617-3300

Formulado por:
NANJING RED SUN CO., LTD.
N° 8. Dongfeng Road, Yaxi Town,
Gaochun, Nanjing. Jiangsu, China.

Importado y Distribuido por:
SILVESTRE PERÚ S.A.C.



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

