LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
- No comer, no beber ni fumar durante y después de la aplicación sin haberse lavado con agua y jabón.
- Conservar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado. No almacenar, ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas, debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Piretroide
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de ingestión, sólo si el paciente está consciente y alerta, inducir al vómito. Dar de beber agua en abundancia.
- En caso de contacto con los ojos, mantenerlos abiertos y lavarlos con abundante agua fría durante 15 a 20 minutos.
- En caso de contaminación de la piel, remover la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el área afectada con jabón y grandes cantidades de agua durante 15 a 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y llevarla a un lugar abierto; despejar las ropas que están alrededor del cuello y pecho.

TELEFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX 0-800-1-3040
SILVESTRE 01-617-3300
ALO ES SALUD 0-801-10200

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de utilizar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin
- No disponer los envases con residuos municipales.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en épocas de floración.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar en cultivos aledaños o sobre malezas.
- Aplicar temprano en las mañanas o por las tardes o noches. Evitar la deriva por el viento.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una abanda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

PRECISION 100 EC

INSECTICIDA AGRICOLA

Concentrado Emulsionable (EC)

Composición Química:

Alpha-cypermethrin.....	100 g/L
Naphta.....	799.7 g/L
Aditivos	c.s.p. 1 L

Registro PQUA Nº - SENASA

Contenido Neto : **1 L**

Nº Lote
F. de Form.
F. de Venc.

Silvestre Protección Vegetal

Fabricado y Formulado por: **TAGROS CHEMICALS INDIA LTD.**
"Jhaver Centre", Rajah Annamalai Building. IV Floor, 72, marshalls road, Egmore, Chennai-600008, India.

Importado y Distribuido por: **SILVESTRE PERÚ S.A.C.**
Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.
Tel.: (01) 617-3300 Fax: (01) 617-3312
Correo electrónico: sec@gruposilvestre.com.pe

NO EXPLOSIVO

NO CORROSIVO

INFLAMABLE

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **PRECISION 100 EC** es un insecticida que actúa por contacto e ingestión, empleado en el control de la plagas recomendadas en esta etiqueta.
- Para su preparación, llenar con agua hasta la mitad el tanque de aplicación, agregar la dosis recomendada y remover, finalmente completar con agua la capacidad total del tanque, remover y aplicar. Realizar la aplicación con equipo de aspersión manual o mecánico tratando de efectuar una aplicación uniforme.
- Se recomienda que diluido el producto, no puede ser almacenado por más de 12 horas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	ml/cil 200L	ml/ha		
ALGODÓN	"Gusano preforador de la bellota"	*Heliothis virescens*	100	100	14	0.2

LMR: Límite Máximo de Residuos. **PC**: Período de Carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar **PRECISION 100 EC** (alpha-cypermethrin) máximo una aplicación / campaña / año.
- El momento de aplicación será cuando se observen las primeras posturas y/o larvas durante el crecimiento vegetativo.

PERIODO DE REINGRESO
No ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

- **PRECISION 100 EC** es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas, excepto con agentes oxidantes o productos de reacción alcalina.
- Si se efectuara mezclas, éstas deben ser utilizadas el mismo día de su preparación.
- En caso de duda, se recomienda efectuar previamente una mezcla de compatibilidad física a la dosis recomendada.

FITOTOXICIDAD
No es fitotóxico usado a la dosis recomendada en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular de Registro garantiza que las caracterísicas fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etitqueta y que, es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

Medidas en cm

Envase: COEX