

28,3 ± 0,3

0,8 ± 0,2 0,5 ± 0,2

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
- No comer, no beber ni fumar durante y después de la aplicación sin haberse lavado con agua y jabón.
- Conservar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado. No almacenar, ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas, debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS
Grupo Químico: Piretroide.

- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito en la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX 0-800-1-3040 o 328 7398
ESSALUD 0801-10200 o 411-8000 (opción 4)
CISPROQUIM: 0800-59847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas y artrópodos beneficios.
- No aplicar en épocas de floración.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar en cultivos aledaños o sobre malezas.
- Aplicar temprano en las mañanas o por las tardes o noches. Evitar la deriva por el viento.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



INSECTICIDA AGRÍCOLA
Concentrado Emulsionable (EC)

Composición Química:

Alpha-cypermethrin.....	100 g/L
Cyclohexanone.....	100g/L
Aditivos.....	120 g/L
Naptha.....	c.s.p. 1 L

Registro PQUA N° 507- SENASA

Titular de Registro: SILVESTRE PERÚ S.A.C.
Calle Arica 242 Miraflores Lima 18 - Perú
Teléfono: (01) 617-3300 Fax: (01) 617-3312
correo electrónico: sec@silvestre.com.pe

Fabricado y Formulado por: NOVA CROP PROTECTION CO., LTD.
8 South Liyuan Road, Jiangning Dis.
Nanjing 211100 CHINA

Importado y Distribuido por: SILVESTRE PERÚ S.A.C.



Contenido Neto: **1 L**
F. de Form:
N° Lote:
F. de Venc:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO  NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- PRECISION® 100 EC** es un insecticida que actúa por contacto e ingestión, empleado en el control de las plagas recomendadas en esta etiqueta.
- Para su preparación, llenar con agua hasta la mitad el tanque de aplicación, agregar la dosis recomendada y remover, finalmente completar con agua la capacidad total del tanque, remover y aplicar. Realizar la aplicación con equipo de aspersión manual o mecánico tratando de efectuar una aplicación uniforme.
- Se recomienda que diluido el producto, no puede ser almacenado por más de 12 horas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	ml/200L	ml/ha		
ALCACHOFA	"Gusano perforador"	<i>Heliothis virescens</i>	200	-	7	0.1
ALGODÓN	"Gusano perforador de la bellota"	<i>Heliothis virescens</i>	100	100	14	0.2
ESPARRAGO	"Gusano foliador"	<i>Heliothis virescens</i>	250	-	3	0.1

PC: Período de Carenia LMR: Límite Máximo de Residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Realizar como máximo una aplicación de **PRECISION® 100 EC** por campaña/año.
- Aplicar cuando se observen las primeras posturas y/o larvas, durante el crecimiento vegetativo.

PERIODO DE REINGRESO
No ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD
PRECISION® 100 EC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con agentes oxidantes o productos de reacción alcalina. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD
PRECISION® 100 EC no es fitotóxico para los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular de Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

15,0 ± 0,3

2,3

Medidas en cm

Envase: COEX

L. PRECISION T. LAVADO	L. SILVESTRE L. PRECISION T. LAVADO	B. TOXICOLÓGICA	TEXTO
			
PANTONE 288 C	PANTONE 355 C	P. YELLOW C	P. Process Black

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del CSGC del GRUPO SILVESTRE