

# MANKOMET

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**POLVO MOJABLE - WP**

## COMPOSICIÓN QUÍMICA

- Ingrediente activo:
  - Metalaxyl..... 80 g/kg
  - Mancozeb..... 640 g/kg
- Aditivos ..... 280 g/kg

**Reg. PQUA N° 200 - SENASA**

**CONTENIDO NETO: 1 Kg**

Número de Lote :  
Fecha de Formulación :  
Fecha de Vencimiento :

TITULAR DEL REGISTRO: **DROKASA PERÚ S.A.**

Av. 28 de Julio N° 150 piso 7 - Miraflores.

Teléfono: 219-3901 / Fax: 219-3929

FABRICADO POR:

Vickylu Industries. Inc.

3665 Ocean View Ave. Los Angeles, CA 900066. USA.

AGRIA S.A.

Asenovgradsko shose, 4009 Plovdiv, Bulgaria.

FORMULADO Y ENVASADO POR: SERFI S.A.

Av. Oscar Benavides N° 380 Of. 701 - Miraflores.



**DROKASA**  
P E R U

**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.**

**NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO - CUIDADO**

**“LEA TOTALMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- El contacto prolongado y repetido puede causar reacciones alérgicas a la piel en ciertas personas.
- “Este producto es nocivo si se ingiere”
- “Este producto puede causar sensibilización por contacto con la piel”
- “Este producto es irritante para el sistema respiratorio”
- “Use lentes integrales de protección”
- “No ingerir, ni inhalar la nube de aspersión y evitar el contacto con los ojos y la piel”
- “No coma, ni beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación”
- Utilice ropa protectora y guantes durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de manipular y aplicar el producto lávese con abundante agua y jabón.
- Lave la ropa contaminada antes de volver a usar.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- El producto no puede ser usado por personas que mantengan tratamiento por epilepsia, especialmente Fenobarbital.
- El producto no puede ser usado por personas que tengan problemas de tiroides o estén bajo tratamiento de afecciones tiroideas.

- “No contamine fuentes de agua, lagos, ríos, estanques, arroyos o drenajes con los restos de la aplicación o sobrantes y envases vacíos del producto”
- “Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros”
- “Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre”
- “El producto no debe aplicar en zonas con NAPA FREÁTICA ALTA”
- “En caso de derrame, recoger el producto con algún material absorbente (por ej. Aserrín), colóquelo en una bolsa plástica y dépositelo en un sitio destinado por las autoridades locales para este fin”

**INDICACIONES DE USO Y MANEJO**

**MANKOMET**, es la combinación de dos ingredientes activos, metalaxyl y mancozeb. El metalaxyl es un fungicida sistémico con acción preventiva y curativa, absorbido por vía foliar y radicular. El mancozeb es un fungicida preventivo de contacto. La combinación de estos dos productos da como resultado un formulado que cubre un mayor espectro de acción y en consecuencia, da una mayor eficacia.

**PREPARACIÓN Y APLICACIÓN**

**MANKOMET**, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar. Aplique con mochila manual.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- **En caso de EMERGENCIAS llamar a:**  
**CICOTOX Teléfono: 0 800-13040 (Atención 24 horas) ó**  
**ESSALUD Teléfono: 423-7600**
- **NOTA AL MÉDICO:** No hay un antídoto específico. En caso de ingestión efectuar un lavado gástrico, administrar un laxante salino. No administrar grasas ni aceites. Ayude a la circulación. El tratamiento será sintomático y de sostén.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Se recomienda aplicar **MANKOMET** una aplicación / campaña al año, cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones climáticas sean favorables para la aparición de las mismas. Se recomienda un máximo de 1 aplicación / campaña.

**PERIODO DE REINGRESO**

No ingrese a las áreas tratadas hasta **24** horas después de la aplicación.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados.

**CONDICIONES DE MANEJO DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y dépositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No disponer los envases con residuos municipales.

**COMPATIBILIDAD**

**MANKOMET**, es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso agrícola excepto aquellos de reacción alcalina. Antes de preparar la mezcla se recomienda consultar con un especialista.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

“Peligroso para los organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas”

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

**CUADRO DE USOS Y DOSIS**

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS Kg/ha	PC días	LMR ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Papa	“Hielo o Ranca”	<i>Phytophthora infestans</i>	2.0 - 3.0	14	0.1
Páprika	“Hielo o Ranca”	<i>Phytophthora infestans</i>	2.0 - 3.0	15	0.5

LMR: Límite máximo de residuos

PC: Periodo de carencia

\*\* La dosis mínima corresponde a aplicaciones preventivas en plantas tiernas. En plantas desarrolladas y cuando la presión de la enfermedad es alta, usar las dosis altas.

