

**PRECAUCIONES, MANIPULEO, ALMACENAJE Y TRANSPORTE.**

- **SUCCESSOR<sup>®</sup> SC** requiere que los operarios que lo manejen y apliquen, usen elementos de seguridad correspondientes al manejo de productos "ligeramente tóxicos" (overol, guantes, gorra, botas de caucho, mascarilla y gafas).
- Revise el estado del equipo de aplicación y reemplace los elementos defectuosos. No se exponga, ni respire la neblina y vapores de la aspersión.
- Evitar el contacto con la piel, los ojos y los vestidos.
- No reutilizar los vestidos y los equipos sin haber sido lavados y revisados previamente; si cualquier parte del cuerpo entra en contacto con el producto, lávela con abundante agua y jabón.
- **SUCCESSOR<sup>®</sup> SC** No debe almacenarse ni transportarse junto con bebidas, alimentos y drogas. Manténgase bajo control, en su envase original debidamente cerrado.
- Para periodos de almacenamiento cortos se recomienda almacenar el producto en lugares frescos y secos. Para periodos de almacenamiento mayores a dos semanas, manténgase refrigerado a temperaturas menores de 10 °C. Las temperaturas bajas solidifican el producto y lo conservan con toda su calidad.
- Para su uso posterior dele tiempo suficiente para descongelarse y luego agítelo antes de usarlo.
- El transporte debe garantizar que el producto no permanezca a altas temperaturas. Debe protegerse de la incidencia directa de los rayos solares y altas temperaturas, hasta el momento de la aplicación.

**PRIMEROS AUXILIOS.**

**OJOS:** Lávelos con abundante agua durante 10 a 15 minutos. **PIEL:** retirar los vestigios contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón. **INHALACIÓN:** Retírese para respirar aire fresco. **INGESTIÓN:** Busque asistencia médica, no induzca el vomito.

**ANTÍDOTO:**

No hay antídoto específico, tratar sintómicamente.

**DL<sub>50</sub> del producto formulado**

Aguda oral > 5000 mg/kg. de peso  
Aguda Dermal > 5000 mg/kg. de peso

Teléfono de emergencia : CICOTOX 0800-1-3040

**NOTAS AL MÉDICO:**


Seguir tratamiento sintomático.

NO EXPLOSIVO - NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO

**NOTA AL COMPRADOR:**

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es apto para los fines aquí recomendados, de acuerdo con las indicaciones de empleo.

# SUCCESSOR<sup>®</sup> sc



**(*Paecilomyces fumosoroseus*)**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA SC**

**AGENTE MICROBIAL PARA EL CONTROL DE PLAGAS**

**Composición:**


*Paecilomyces fumosoroseus*, Cepa DSM 15126:

5x10<sup>12</sup> Conidias viables por litro de formulación..... 4%  
Aditivos ..... 96%

## ACARICIDA BIOLÓGICO AGRÍCOLA

Reg. PBUA N° 166 - SENASA

PRODUCIDO Y FORMULADO POR:  
LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A.  
Calle 17 A N° 68 D-38, Bogotá Colombia.



TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:  
FARMAGRO S.A.  
Av. Alfredo Mendiola 6068, Los Olivos, Lima, PERU  
Teléfono: 6141500 Fax: 6141517



MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

**FORMA DE USO:**

**Modo de acción:** **SUCCESSOR<sup>®</sup> SC** actúa por contacto con el insecto. Por lo tanto la aplicación debe hacerse dirigida hacia donde se ubica la plaga y hacia las áreas de desplazamiento de esta. Deben usarse boquillas de baja descarga, alta nebulización (muy pequeño tamaño de gota) y alta turbulencia. La aplicación debe tener muy buen cubrimiento, es decir, alto número de microgotas por unidad de área, para aumentar la probabilidad de contagio del insecto.

**Momento de aplicación:** **SUCCESSOR<sup>®</sup> SC** debe aplicarse siempre al inicio de la infestación y aparición de primeros estadios de la plaga. **Antes de aplicar el producto** asegúrese que no se encuentren residuos de otros productos en los tanques o canecas de mezcla, ni en las mangueras de aplicación, para lo cual se recomienda lavarlos por lo menos cuatro veces con abundante agua.

**SISTEMAS DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN:**

**Preparación de la mezcla:** **SUCCESSOR<sup>®</sup> SC** se usa en dosis de 2 a 5 ml de producto por litro de mezcla de aplicación, según cada caso. Coloque primero parte del volumen de agua y luego agregue el producto en la medida correspondiente a la aplicación que vaya a realizar. Enjuague los recipientes que se hayan untado de producto, vertiendo el enjuague sobre la mezcla a aplicar. Mezcle muy bien. Agregue el agua restante para ajustar la dosis correcta. Agite de nuevo la mezcla total hasta que quede homogénea. Aplique inmediatamente. No guarde mezcla para ser aplicada mas tarde. Agite periódicamente la mezcla durante la aplicación si esta toma mas de media hora. Enjuague el envase para recuperar la totalidad del producto que queda adherido a las paredes del recipiente.

**SUCCESSOR<sup>®</sup> SC** En ácaros controla huevos, ninfas y adultos.

**COMPATIBILIDAD:** Consulte la tabla de compatibilidades de **SUCCESSOR<sup>®</sup> SC** con otros insumos agrícolas con el Departamento Técnico de FARMAGRO S.A.

**FITOTOXICIDAD:** **SUCCESSOR<sup>®</sup> SC** no es fitotóxico, ni fitopatógeno a los cultivos recomendados, pero su formulación exige que el tamaño de gota en la aplicación sea fino para evitar "efecto lupa" sobre las hojas.

**DOSIS RECOMENDADAS**

CULTIVO	NOMBRE DE LA PLAGA		DOSIS (ml/cil. 200 L)	U.A.C (días)	L.M.R (p.p.m)
	Común	Técnico			
MANDARINA	Ácaro del tostado	<i>Phyllocoptura oleivora</i>	350	n.r.	n.r.
PIMIENTO	Ácaro hialino	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	250 - 300	n.r.	n.r.
PALTO	Ácaro marrón	<i>Oligonychus punicae</i>	300 - 350	n.r.	n.r.

n.r. = No requiere.

U.A.C.=ULTIMA APLICACION A LA COSECHA: No existe intervalo de tiempo requerido entre la aplicación y la cosecha o la reentrada al cultivo.  
L.M.R.=LÍMITE MÁXIMO DE RESIDUOS: No requiere por tratarse de un producto de origen natural.

**AGÍTESE ANTES DE USAR**

"Manténgase alejado de las personas, animales, productos alimenticios y medicinales"



**LIGERAMENTE TÓXICO  
PRECAUCIÓN**

"Destruya este envase inmediatamente después de usar el producto"

