

"LEA TOTALMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Moderadamente irritante a la piel, usar el producto con equipo de protección personal.
- Moderadamente irritante a los ojos. Puede causar daño temporal; daño o irritación de la córnea.
- Ligeramente irritante por inhalación.
- Tóxico por ingestión.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No utilice este envase para almacenar alimentos o agua.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Fenoxiacéticos.
- En caso de intoxicación lleve al paciente al médico inmediatamente y muéstrele la etiqueta.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y lleve al paciente al oftalmólogo; si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón y consultar al médico.
- **En caso de emergencias llamar a: CICOTOX 0800-13040 (Atención 24 horas), ESSALUD EN LINEA 411-8000 Opción 4.**
- NOTAAAL MÉDICO: Aplique tratamiento sintomático. No tiene antídoto específico.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelos triturándolos o perforándolos y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Los envases una vez usados se deben acumular en sitios especiales para ello. No botar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contamine lagos, ríos, estanques o arroyos y drenajes con los desechos y envases vacíos del producto.
- No contamine las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en suelos con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoja el producto y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.

AMINO 1-A®

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Sal de dimetilamina 2,4 D 720 g/L
 Aditivos 490 g/L

Reg. PQUA N° 369- SENASA

CONTENIDO NETO: 20 Litros

Número de Lote :
 Fecha de Formulación :
 Fecha de Vencimiento :



TITULAR DEL REGISTRO: PINERAL ANDINA S.A.
 Av. Flora Tristán 463 Of 201. Urbanización Santa Patricia
 II Etapa. La Molina. Lima Perú
 Teléfono 348-1018 / Telefax 349-9609

FORMULADO POR: POINT AGRO-CHINA LIMITED
 Room 1505-1506 Diamond Business Centre
 Nanxing Street, Shangcheng District
 Hangzhou 310008, China
 Tel: +86(0)571-86959101 Fax: +86(0)571-28007617

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
SOLUCIONES TÉCNICAS DEL AGRO S.A.C
 Av. Guillermo Dansey 2176
 Lima Cercado - Perú
 Telf : (01) 3368645
 Fax : (01) 3368299

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

INDICACIONES DE USO Y MANEJO

AMINO 1-A es un herbicida hormonal selectivo post emergente, aplicado sobre las malezas se transloca hacia las partes apicales (de crecimiento continuo) activando de manera descontrolada el desarrollo de la planta con su consiguiente muerte.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Llenar el tanque con agua hasta la mitad, luego diluya la dosis indicada y complete con agua hasta alcanzar el volumen total, agite y proceda a aplicar. La aplicación se puede hacer con cualquier equipo de aspersión, manual o mecánico y con boquilla para herbicidas de buena cobertura, tratando de hacer una aplicación uniforme. Hacer las aplicaciones por las mañanas (poco viento) para evitar la contaminación de cultivos vecinos.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

USOS Y DOSIS

Cultivo	Malezas		Dosis L/200 L	PC días	LMR ppm
	Nombre Común	Nombre Científico			
Caña de azúcar	Yuyo	<i>Amaranthus hybridus</i>	1	*	2
	Rajamano	<i>Sida spinosa</i>	1	*	2
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>	1	*	2

PC: Periodo de carencia en días

*No aplicable

LMR: Limite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda aplicar después de la siembra en las primeras etapas de las malezas, repetir la aplicación si es necesario 10 días después. Realizar un máximo de 2 aplicaciones/campaña/año.

PERÍODO DE REINGRESO: 24 horas.

COMPATIBILIDAD: Por su especificidad sobre el control de malezas de hoja ancha se recomienda aplicar solo.

FITOTOXICIDAD: AMINO 1-A no es fitotóxico a las dosis recomendadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

