

1 cm

14 cm

1 cm

1 cm

# CASCABEL 90PS®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**POLVO SOLUBLE - SP**

**COMPOSICIÓN:**

Methomyl ..... 900 g/kg  
Aditivos.....c.s.p..1 kg

Reg. PQUA N° 130 - SENASA

VENTA CON PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO



**Point**  
ENTREGAMOS  
CALIDAD

**Titular de Registro, Importado y Distribuido por:**  
**POINT ANDINA S.A.**  
Calle Loreto 304 Urbanización Santa Patricia II Etapa. La Molina. Lima, Perú  
Teléfono: 348-1018

**Formulado por:**  
**POINT INTERNATIONAL LTD.**  
42 St Margarets Grove Twickenham  
TW 1 1JG United Kingdom  
Teléfono: (44-20) 88923862

**CONTENIDO NETO: 100 g**

Lote N°:  
Fecha de formulación:  
Fecha de vencimiento:

**NO INFLAMABLE**

**NO CORROSIVO**

**NO EXPLOSIVO**



**ALTAMENTE PELIGROSO  
TÓXICO**

1 cm

**LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA  
ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Almacenar y transportar en lugar sombreado, seco y ventilado, en sus envases originales y bien cerrados.
- No comer, no beber ni fumar durante y después de la aplicación sin haberse lavado con agua y jabón.
- Evite su almacenamiento y transporte junto a productos alimenticios o medicinas de uso humano o veterinario.
- No contaminar los ríos, lagos o fuentes de agua.
- Usar guantes, máscara, gafas protectoras y mameluco con protector plástico durante la preparación y aplicación del producto.
- Peligroso para peces, abejas y otras formas de vida silvestre.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

Grupo químico: Carbamatos  
En caso de intoxicación, llamar al médico. Provocar el vómito si está consciente y luego aplicar tratamiento sintomático y de sostén. Al contacto con la piel y los ojos, lavarlos rápidamente con abundante agua limpia y jabón.

Cuando hay síntomas de intoxicación aplicar sulfato de atropina en forma intravenosa o intramuscular 1 - 2 mg en adultos, repetir si es necesario.

**Teléfonos de emergencia:**

CICOTOX: 328 7700  
ESSALUD: 411 8000 opción 4  
CISPROQUIM: 0800 50847

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. No utilizar este envase para conservar alimentos.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para abejas y artrópodos benéficos.
- Peligroso para invertebrados acuáticos no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Peligroso para animales domésticos, flora y fauna silvestre.
- No aplicar el producto en suelos con napa freática superficial.
- Respetar una banda de protección hacia fuentes de agua de al menos 5 metros.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**CASCABEL 90 PS** es un insecticida en polvo del grupo de los carbamatos que actúa por contacto e ingestión. Es un insecticida de amplio espectro de acción, que altera las funciones neurofisiológicas de los insectos. Aplicar con cualquier equipo de aspersión, tratando de lograr una cobertura uniforme.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS		P.C. (Días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	kg/ha	g/cil		
Alcachofa	"Barrenador de brotes"	<i>Heliothis virescens</i>	0.4	200	N.d	0.2
Cebolla	"Trips"	<i>Thrips tabaci</i>	0.4-0.6	200-300	7	0.2
Espárrago	"Barrenador de brotes"	<i>Heliothis virescens</i>	0.4	200	1	2
Maíz	"Cogollero"	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.5-0.6	250-300	7	0.1
Pimiento	"Barrenador de brotes"	<i>Heliothis virescens</i>	0.4	200	3	1
Pimiento	"Gusano del fruto"	<i>Symmetrischema capsicum</i>	0.4	200	3	1
Tomate	"Gusano del fruto"	<i>Spodoptera eridania</i>	0.4	200	7	1

P.C.: Periodo de carencia. L.M.R.: Límite Máximo de Residuos (partes por millón)  
N.d: No determinado

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Se recomienda aplicar en cualquier etapa del cultivo. Se recomienda un máximo de 2 aplicaciones por campaña.

**PERIODO DE REINGRESO:**

No entrar a las áreas tratadas durante las primeras 24 horas después de la aplicación

**COMPATIBILIDAD:**

CASCABEL 90 PS es compatible con plaguicidas de uso común excepto con los de reacción alcalina o los compuestos de cobre

**FITOTOXICIDAD:**

CASCABEL 90 PS no es fitotóxico a los cultivos indicados en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular de registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en las etiquetas y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones dadas.



**PANTONES**



LOGO POINT

BANDA TOXICOLÓGICA

LOGO CASCABEL 90 PS