

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“Manténgase bajo llave fuera del alcance de los niños”

PRECAUCIONES , ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION:

- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No coma, ni beba, ni fume durante la preparación o aplicación.
- Conserve el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacénese en un lugar seco y sombreado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Utilizar el equipo de protección personal: ropa protectora (camisa manga larga y pantalón largo) y botas de caucho, guantes, gafas de protección ocular y respiratoria, durante el manipuleo y aplicación.
- No transporte ni almacene junto con personas, animales, alimentos, medicinas de uso humano, ni con forrajes u otro tipo de alimentos para animales.

PRIMERO AUXILIOS:
Grupo químico Cloroacetanilida

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lávese con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Solicitar atención médica.
- En caso de ingestión dar de beber agua solo si la persona esta conciente. No inducir el vómito. Solicitar atención médica.
- En caso de inhalación. Trasladar a la persona hacia el aire fresco.
- No tiene antídoto. Aplicar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN:
CICOTOX: 0800-1-3040

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua potable. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en un lugar destinado por las autoridades locales para éste fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:
Tóxico para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
No contaminar ríos, estanques, arroyos con los desechos o bolsas vacías.
No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
Peligroso para los animales domésticos, flora y fauna silvestre; no permitir animales en el área tratada.
El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Chem-RICE®
5 G
Herbicida Agrícola
Granulado (GR)

Composición Química:
Butachlor.....50 g/Kg
Aditivos.....950 g/Kg

PQUA N° 386 - SENASA
R.U.C.N° 20100180210

LOTE:
FECHA DE FABRICACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:

Fabricante:
HANGZHOU CHANGHE AGRICULTURAL CHEMICAL CO., LTD
Riverside wharf, Changhe Town, Hangzhou, Zhejiang Province, China
CHINA
Tel: (+86) 571 - 86624059

Formulador y Titular del registro:
FARMAGRO S.A.
Av. Alfredo Mendiola 6068, Los Olivos - Lima, PERÚ
Telefono: 614-1500, Fax: 614-1517

FARMAGRO S A
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

NO EXPLOSIVO NO INFLAMABLE
NO CORROSIVO

© Marca registrada de FARMAGRO S.A.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
Chem-RICE 5G, es un herbicida granulado altamente selectivo al cultivo de arroz, para ser usado en el control pre-emergente de malezas gramíneas y algunas de hoja ancha.

SISTEMA DE APLICACIÓN:
Antes de usar **Chem-RICE 5G**, se debe cerrar la circulación del agua para que esta permanezca por lo menos 48 horas en la poza.
Aplique **Chem-RICE 5G**, al voleo sobre la lámina de agua de 5 a 10 cm.

“Consulte con un Ingeniero Agrónomo”

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS kg/ha	UAC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Arroz (transplante)	Moco de Pavo	<i>Echinochloa crusgalli</i>	50	60	1
	Gramma de lefe o chapatolla	<i>Echinochloa colonum</i>			
	Pajilla	<i>Leptochloa uninervia</i>			
	Piso	<i>Eleocharis spp.</i>			
	Florcita o botoncito	<i>Eclipta alba</i>			
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>			
	Correhuela	<i>Ipomoea quinquefolia</i>			
	Mazorquilla	<i>Ischaenum rugosum</i>			

UAC = Última aplicación a la cosecha; LMR = Límite máximo de residuos en ppm


FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN:
El **Chem-RICE 5G**, se debe aplicar inmediatamente después del transplante hasta los 6 (seis) días después de realizado este, siempre antes de la emergencia de las malezas.
Dejar que la lámina de agua presente en la poza se seque, antes de suministrar el nuevo riego, luego reabrir la circulación del agua.
Realizar una sola aplicación por campaña año.

PERIODO DE REINGRESO:
12 horas.

COMPATIBILIDAD:
Realizar una prueba de compatibilidad previamente.

FITOTOXICIDAD:
Chem-RICE 5G no presenta efectos fitotoxicos si se aplica en los cultivos, forma y dosis recomendadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.



Ligeramente peligroso
CUIDADO

