



PLAGUICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA


FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN

Polyoxin B 11 %
Aditivos c.s.p. 100 %

Reg. PBUA N° 223 - SENASA



Point
ENTREGAMOS
CALIDAD

Titular de Registro, Importado y
Distribuido por:

POINT ANDINA S.A.

Calle Loreto 304 Urbanización Santa Patricia
II Etapa. La Molina. Lima Perú
Teléfono: 3481018 - 3499609

Formulado por:

XI'AN BEINONGHUA CROP
PROTECTION CO. LTD.

N° 8, Dongfeng Road, Weiyang District,
Xi'An, China
Teléfono: 029-86171522

Contenido neto: **1 kg**

Número de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

PRECAUCIÓN

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Utilizar mascarilla de protección durante la preparación de la solución.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Triazol
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con agua por 15 a 20 minutos, remover los lentes de contacto si los hubiera. Si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión no inducir al vómito, beber y enjuagar la boca con abundante agua. No administrar nada a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y enjuagar la piel con abundante agua por 15 a 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar ventilado. Si la persona tienen dificultad para respirar, dar respiración artificial.

En caso de emergencias llamar a:

CICOTOX: 328 7700; ESSALUD: 411 8000 opción 4;
CISPROQUIM: 0800 50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido inutilice este envase triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contamine las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

VIRTUOX WP es un fungicida biológico de amplio espectro de control, tiene acción de contacto y sistémico.

VIRTUOX WP inhibe la síntesis de la quitina presente en la pared celular del hongo, evitando la germinación de las esporas, así como el crecimiento del tubo germinativo.

Para su aplicación, mezclar las dosis recomendadas en un poco de agua hasta obtener una suspensión uniforme. Luego vaciar el contenido en un cilindro o tanque de aplicación y completar con agua hasta la capacidad total. Aplicar con mochila mecánica o a motor.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda un máximo de 2 aplicaciones por campaña por año, cuando se observe los primeros síntomas de la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO:

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD Es compatible con la mayoría de los plaguicidas, con excepción de los que tienen reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD No es fitotóxico a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en las etiquetas y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	NOMBRE DE LA PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	kg/200 L	kg/ha		
Alcachofa	“Oidium”	<i>Leveillula taurica</i>	-	0.75	N.A.	N.A.
Granado	“Mancha negra de la hoja”	<i>Alternaria alternata</i>	0.5 - 0.6	-	N.A.	N.A.
Pimiento	“Oidium”	<i>Leveillula taurica</i>	0.5	-	N.A.	0.3
Vid	“Oidium”	<i>Uncinula necator</i>	-	0.75 - 1.0	N.A.	0.3

P.C.: Período de Carencia.

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos (partes por millón).

N.A.: No Aplica

