

PRECAUCIONES, MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

FINALL® 40 WP es un insecticida biológico de uso agrícola **LIGERAMENTE TÓXICO**; sin embargo, durante su manejo se recomienda tomarse las siguientes medidas de precaución:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de manipuleo, mezcla y aplicación del producto.
- Usar ropa de protección durante el manipuleo, mezcla, aplicación del producto.
- Terminada la aplicación, lavarse con abundante agua y jabón; y cambiarse de ropa.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas forrajeras y/o semillas.
- Transportar el producto protegido en un envase adecuado.
- Conservarse el producto en el envase original, etiquetado y cerrado; no reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Almacenar el producto en lugares frescos y bien ventilados.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y, si el contacto fuese con la piel lávese con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- **Antídoto:** No requiere.

NOTA AL MÉDICO

Ligeramente tóxico
DL50 oral: > 2000 mg/kg
DL50 dermal: > 1000 mg/kg
CL50 inhalatoria: > 5.0 mg/l

NO EXPLOSIVO NO CORROSIVO NO INFLAMABLE

NOTA AL COMPRADOR

El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

CUADRO DE DOSIFICACIONES

CULTIVO	ENFERMEDAD		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	g/ha	g/cil 200 L		
ESPARRAGO	Gusano Ejército	<i>Spodoptera eridania</i>	600	250	No existen restricciones en la aplicación de FINALL 40 WP	—

LMR.: Límite Máximo de Residuos
PC.: Período de carencia

INDICATIVOS DE USO

FINALL® 40 WP es un insecticida producido por la bacteria *Bacillus thuringiensis* durante su esporulación, con acción letal para larvas de Lepidópteros en varios cultivos. **FINALL® 40 WP** actúa por ingestión. Poco tiempo después de ingerirlo las larvas dejan de alimentarse, permaneciendo vivas aunque sin causar daños. La muerte de las larvas puede producirse entre las 48 y 72 horas después de la aplicación.

SISTEMA DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

FINALL® 40 WP se emplea mezclando con agua limpia la dosis recomendada en el cuadro de usos. Aplicar en pulverizaciones al follaje asegurándose de lograr una cobertura total, empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochila a palanca, a motor, tecnomas, parihuelas, etc.) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

- Iniciar las aplicaciones al observar los primeros signos de infestación en el cultivo (Larvas de 1º y 2º estadio).
- Puede hacerse una segunda aplicación a los 10 - 12 días después de la primera.
- Realizar hasta 3 aplicaciones por campaña.

COMPATIBILIDAD

FINALL® 40 WP es compatible con la mayoría de las plaguicidas de uso común; excepto con materiales alcalinos.

FITOTOXICIDAD

No se han reportado problemas de fitotoxicidad en los cultivos por exceso de uso de este producto.

Finall 40 WP

(*Bacillus thuringiensis* var. *kurstaki*)
INSECTICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA
Polvo Mojable (WP)

Composición Química:

<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>Kurstaki</i> (con una potencia de 32,000 U.I./ mg de producto)	40.0%
Inerte	60.0%
Total	100.0%

INSECTICIDA BIOLÓGICO AGRÍCOLA

Registro PBUA N° 211 -SENASA

silcrop
nutriprotección

Titular del Registro: **SILCROP S.A.C**
Jr. Tampumachay 306,
Urb. Tambo de Monterrico. Surco, Lima-Perú.
Telf: (01) 714-9029 / 714-9021 / 714-1102

Formulador: **IBERFOL S.L.**
Camino de la Sierra, s/n nave N°5-03350 COX
Alicante-España



Importado y Distribuido por: **SILCROP S.A.C.**

Contenido: 1000 g

N° Lote.:
F. de Form.:
F. de Venc.:

**LIGERAMENTE TÓXICO
PRECAUCIÓN**

