Finall 40 WP

(Bacillus thuringiensis* var. *kurstaki)

INSECTICIDA BIOLOGICO DE USO AGRICOLA

Polvo Mojable (WP)

Composición Química

Bacillus thuringiensis var. Kurstaki (con una potencia de 32,000 U.I./ mg de producto)	40.0%
Inertes	60.0%
Total	100.0%

INSECTICIDA BIOLOGICO AGRICOLA

Registro PBUA N° 211 -SENASA

Titular del Registro: **SILCROP S.A.C**
Jr. Tampumachay 306,
Urb. Tambo de Monterrico. Surco, Lima-Perú.
Telf: (01) 714-9029 / 714-9021 / 714-1102 / 714-1514

Formulador: **IBERFOL S.L.**
Camino de la Sierra, s/n nave N°5-03350 COX
Alicante-España

Importado y Distribuido por: **SILCROP S.A.C.**

Contenido: 1000 g
N° Lote.:
F. de Form.:
F. de Venc.:

LIGERAMENTE TÓXICO
PRECAUCIÓN

PRECAUCIONES, MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

FINALL® 40 WP es un insecticida biológico de uso agrícola LIGERAMENTE TÓXICO; sin embargo, durante su manejo se recomienda tomarse las siguientes medidas de precaución:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de manipuleo, mezcla y aplicación del producto.
- Usar ropa de protección durante el manipuleo, mezcla, aplicación del producto.
- Terminada la aplicación, lavarse con abundante agua y jabón; y cambiarse de ropa.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas forrajes y/o semillas.
- Transportar el producto protegido en un envase adecuado.
- Conservese el producto en el envase original, etiquetado y cerrado; no reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Almacenar el producto en lugares frescos y bien ventilados.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y, si el contacto fuese con la piel lávese con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- **Antidoto:** No requiere.

NOTA AL MÉDICO
Ligeramente tóxico
DL50 oral: > 2000 mg/kg
DL50 dermal: > 1000 mg/kg
CI50 inhalatoria: > 5.0 mg/l

NO EXPLOSIVO **NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE**

NOTA AL COMPRADOR
El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"MANTENGASE ALEJADO DE LAS PERSONAS, ANIMALES, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MEDICINALES"

INDICATIVOS DE USO
FINALL® 40 WP es un insecticida producido por la bacteria ***Bacillus thuringiensis*** durante su esporulación, con acción letal para larvas de Lepidópteros en varios cultivos. **FINALL® 40 WP** actúa por ingestión. Poco tiempo después de ingerirlo las larvas dejan de alimentarse, permaneciendo vivas aunque sin causar daños. La muerte de las larvas puede producirse entre las 48 y 72 horas después de la aplicación.

SISTEMA DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN
FINALL® 40 WP se emplea mezclando con agua limpia la dosis recomendada en el cuadro de usos. Aplicar en pulverizaciones al follaje asegurándose de lograr una cobertura total, empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochila a palanca, a motor, tecnomas, parihuelas, etc.) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

- Iniciar las aplicaciones al observar los primeros signos de infestación en el cultivo (Larvas de 1° y 2ª estadio).
- Puede hacerse una segunda aplicación a los 10 - 12 días después de la primera.
- Realizar hasta 3 aplicaciones por campaña.

COMPATIBILIDAD
FINALL® 40 WP es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común; excepto con materiales alcalinos.

FITOTOXICIDAD
No se han reportado problemas de fitotoxicidad en los cultivos por exceso de uso de este producto.

C U A D R O D E D O S I F I C A C I O N E S

CULTIVO	ENFERMEDAD		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	g/ha	g/cil 200 L		
ESPARRAGO	Gusano Ejército	*Spodoptera eridania*	600	250	No existen restricciones en la aplicación de FINALL® 40 WP	-

LMR.: Límite Máximo de Residuos
PC.: Periodo de carencia

"DESTRUYA ESTE ENVASE INMEDIATAMENTE DESPUES DE USAR EL PRODUCTO"

PRECAUCIONES, MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

FINALL® 40 WP es un insecticida biológico de uso agrícola LIGERAMENTE TÓXICO; sin embargo, durante su manejo se recomienda tomarse las siguientes medidas de precaución:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de manipuleo, mezcla y aplicación del producto.
- Usar ropa de protección durante el manipuleo, mezcla, aplicación del producto.
- Terminada la aplicación, lavarse con abundante agua y jabón; y cambiarse de ropa.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas forrajes y/o semillas.
- Transportar el producto protegido en un envase adecuado.
- Conservese el producto en el envase original, etiquetado y cerrado; no reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Almacenar el producto en lugares frescos y bien ventilados.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y, si el contacto fuese con la piel lávese con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- **Antidoto:** No requiere.

NOTA AL MÉDICO
Ligeramente tóxico
DL oral: > 2000 mg/kg
DL dermal: > 1000 mg/kg
CL inhalatoria: > 5.0 mg/l

NO EXPLOSIVO **NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE**

NOTA AL COMPRADOR
El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"MANTÉNGASE ALEJADO DE LAS PERSONAS, ANIMALES, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MEDICINALES"

Finall 40 WP
(Bacillus thuringiensis var. kurstaki)
INSECTICIDA BIOLOGICO DE USO AGRICOLA
Polvo Mojable (WP)