

“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos bebidas, medicinas, bebidas, forrajes y/o semillas.
- Transportar el producto protegido en un envase adecuado.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado; no re-ensavar o depositar el contenido en otros envases.
- Almacenar el producto en lugares frescos y bien ventilados.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: No aplica
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
 - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y, si el contacto fuese con la piel, lávese con abundante agua y jabón.
 - No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
 - **Nota al médico:** No requiere antídoto. Tratamiento sintomático.
- Ligeramente tóxico: DL₅₀ oral: > 2000 mg/kg / DL₅₀ dermal: > 1000 mg/kg / CL₅₀ inhalatoria: > 5,0 mg/L

Teléfonos de emergencia:

SAMU: 106
Grupo Agrotecnología: +34 966 73 82 32

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o depositela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrante del producto

THURINGEX

AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO MICROBIANO

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable (WP)

Composición:

Bacillus thuringiensis var. *kurstaki* (con potencia de 32,000 U.I./mg de producto) 400 g/kg
Inerte 600 g/kg
Total 1 Kg

Registro PBUA N° 211-SENASA

Titular de Registro:

Grupo Agrotecnología del Perú S.A.C.
Av. Ricardo Palma Nro 341, Ofc. 304.
Edificio Platino. Miraflores - Lima

Formulador:

Grupo Agrotecnología SL
Polígono Industrial Puente Alto, Parcela 57.
03300 Orihuela (Alicante).España
Tel.: +34 96 673 82 32
Fax: +34 96 530 21 15
info@agrotecnologia.net

Importador y distribuidor:

Hortus S.A.
Calle Sucre 270, Ate, Perú
Tel.: (+51)17179040 / 17179041
www.hortus.com.pe

grupo
agrotecnología
Perú



Fecha de formulación:
N° de lote:
Contenido neto: 1 kg
Fecha de Vencimiento:

NO EXPLOSIVO NO CORROSIVO NO INFLAMABLE

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

THURINGEX es un insecticida producido por la bacteria *Bacillus thuringiensis* durante su esporulación, con acción letal para larvas de Lepidópteros en varios cultivos. THURINGEX actúa por ingestión. Poco tiempo después de ingerirlo, las larvas dejan de alimentarse permaneciendo vivas, aunque sin causar daños. La muerte de las larvas puede producirse entre las 48 y 72 horas después de la aplicación.

Preparación y aplicación

THURINGEX se emplea mezclando con agua limpia la dosis recomendada en el cuadro de usos. Aplicar en pulverizaciones al follaje asegurándose de lograr una cobertura total, empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochila a palanca, a motor, tecnomas, parihuelas, etc.) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	g/ha	g/cil 200		
Espárrago	Gusano ejército	<i>Spodoptera eridania</i>	600	250	No existen restricciones en la aplicación de THURINGEX	-

PC: Periodo de Carenia
LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Iniciar las aplicaciones al observar los primeros signos de infestación en el cultivo (Larvas de 1º y 2º estadio).
- Puede hacerse una segunda aplicación a los 10 días después de la primera.
- Realizar hasta 3 aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO

Ingresar al área tratada después de verificar que se encuentre bien seca.

COMPATIBILIDAD

THURINGEX es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común; excepto con materiales alcalinos.

FITOTOXICIDAD

No se han reportado problemas de fitotoxicidad en los cultivos para los que se recomienda su uso.

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



LIGERAMENTE TÓXICO
PRECAUCIÓN

